

THE TYPES OF LEPIDOPTERA HETEROCERA  
DESCRIBED BY P. MABILLE

x-ref.



BY

P. VIETTE x-ref.

Muséum national d'Histoire naturelle, Paris

and

D. S. FLETCHER x-ref.

British Museum (Natural History)

*Pp.* 389-425.

BULLETIN OF  
THE BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY)  
ENTOMOLOGY Vol. 21 No. 8  
LONDON: 1968

THE BULLETIN OF THE BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), instituted in 1949, is issued in five series corresponding to the Departments of the Museum, and an Historical series.

Parts will appear at irregular intervals as they become ready. Volumes will contain about three or four hundred pages, and will not necessarily be completed within one calendar year.

In 1965 a separate supplementary series of longer papers was instituted, numbered serially for each Department.

This paper is Vol. 21, No. 8 of the Entomological series. The abbreviated titles of periodicals cited follow those of the World List of Scientific Periodicals.

World List abbreviation:  
*Bull. Br. Mus. nat. Hist.* (Ent.).

© Trustees of the British Museum (Natural History) 1968

TRUSTEES OF  
THE BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY)

Issued 26 April, 1968

Price Eighteen Shillings

# THE TYPES OF LEPIDOPTERA HETEROCERA DESCRIBED BY P. MABILLE

By P. VIETTE and D. S. FLETCHER

## SYNOPSIS

The 520 species and forms of Lepidoptera Heterocera described by P. Mabille are listed. They are arranged in families and within each family the original combinations are listed alphabetically. Each name is followed by the original reference; subsequent references relate to the publication of lectotype or neotype designations or to figures of the types. Pin-data and present location are given for the 418 types so far recognized and 70 lectotypes are designated. A full bibliography and an index are included.

In 1954 Viette published a list of 120 types of Mabille species of Madagascan Heterocera that he had recognized in the collection of the Muséum national d'Histoire naturelle in Paris (Viette, 1954 : 377-387). Mabille (1835-1923), a French lepidopterist specializing in Hesperidae (Lepidoptera Rhopalocera), described also over 500 species of Heterocera from the Mediterranean area, from Africa and Madagascar, from New Guinea and Fiji and from Patagonia during the latter half of the nineteenth century. Mabille described species not only from his own collection but also from the collections of many of his contemporaries, notably H. G. Smith, Staudinger, Thierry-Mieg, Joannis and Charles Oberthür and from the collection of the Paris Museum. Only rarely did Mabille label a type as such, so that not only are his types widely dispersed, but they have in the main been unrecognized until recently. After his death in 1923, Mabille's collection of Lepidoptera, which included that of his father-in-law Rambur, passed to René Oberthür from whom his brother, Charles Oberthür, received most of the exotic Heterocera. Part of this material was bought by the British Museum (Natural History) in 1926. In 1953 further African and Madagascan types of Mabille were found in the collection of René Oberthür at Rennes and are now in the Paris Museum and in the collection of Monsieur Cl. Herbulot in Paris.

Since the publication of the 1954 list, a further 82 Mabille types have been recognized in the Paris Museum and 177 have been recognized in the British Museum (Natural History). Twenty Mabille types are the collection of Monsieur Herbulot; the types of twelve species that Mabille described from the Staudinger collection are in the Zoological Museum in Berlin; six Sphingidae types bought by Preston Clark are now in the Carnegie Museum in Pittsburgh and one type from the Thierry-Mieg collection, bought by Paul Dognin, is now in the United States National Museum in Washington.

The present catalogue includes the names of all the 520 species of Lepidoptera Heterocera described by Mabille. Pin-data and present location are given for each of the 418 types so far recognized; a colon separates the data from successive labels. The names of the remaining 102 species, for which no type has yet been recognized, are included in the hope that their publication may stimulate further searches. Species are listed by families; within each family the original combinations are listed alphabetically. Each name is followed by the original reference in an abbreviated

form; references following the original, include authors' names and relate to the publication of lectotype and neotype designations and to illustrations of type specimens. The word lectotype printed in capital letters thus, LECTOTYPE, indicates a designation published for the first time. A full bibliography follows the text.

The following abbreviations of institutions have been used:

B.M. (N.H.)	British Museum (Natural History), London.
C.M.P.	Carnegie Museum, Pittsburgh.
M.N.P.	Museum national d'Histoire naturelle, Paris.
U.S.N.M.	United States National Museum, Washington.
Z.M.B.	Zoological Museum, Berlin.

We should like to thank the following for their co-operation in the preparation of this catalogue: Dr. B. Alberti, Dr. E. M. Hering and Dr. H. J. Hannemann of the Zoological Museum, Berlin; Monsieur Cl. Herbulot of Paris; Dr. H. J. Clench of the Carnegie Museum, Pittsburgh and Dr. E. L. Todd of the U.S. Department of Agriculture, Washington.

#### HEPIALIDAE

*Hepialus fuscus*, 1885 : 56. Patagonia. Not found.

#### COSSIDAE

*Cossus breviculus*, 1880 : 344. Viette, 1951 : 135. Viette, 1954 : 378. Holotype ♂: Madagascar (coll. Mabille < coll. Ch. Oberthür < coll. R. Biederman). In M.N.P.

*Endagria locuples* see Thyrididae.

#### TORTRICIDAE

*Bactra distictana*, 1900 : 751. Madagascar. Not found.

*Bactra punctistrigana*, 1900 : 751. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Conchylis unicolorana*, 1900 : 750. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Grapholita atrana*, 1900 : 751. Viette, 1954 : 379. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Penthina apicinusdana*, 1900 : 750. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Retinia argyromixtana*, 1900 : 751. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Steganoptycha albosectana*, 1900 : 752. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Steganoptycha arciferana*, 1900 : 752. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Steganoptycha leucospilana*, 1900 : 753. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Steganoptycha pusillana*, 1900 : 753. Viette, 1954 : 379. Holotype ♀ (sans tête): Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

- Steganoptycha selenana*, 1900 : 752. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Syngamoneura rubronotana*, 1900 : 750. Viette, 1954 : 380 (as *rubronotata*). Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P. (Espèce type du genre.)
- Tortrix ocellata*, 1900 : 750. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Tortrix rubrostrigana*, 1900 : 749. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Tortrix saclava*, 1900 : 749. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Tortrix stipulaceana*, 1900 : 749. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

#### PSYCHIDAE

- Oeceticus saclavus*, 1890a : 52. Viette, 1954 : 379. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Psyche joannisii*, 1888a : lxxvii. Viette, 1954 : 379. Lectotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.

#### TINEIDAE

- Tinea galeatella*, 1888 : 34, pl. 3 : 10. Holotype ♀: Archipel. du Cap Horn, baie Orange (*Hyades et Hahn*). In M.N.P.
- Trichophaga deserticola*, 1907a : 79. Holotype ♂: Tunisie, Kébili, mars 1906. In M.N.P.

#### AEGERIIDAE

- Melittia iridisquama*, 1890 : 34. Holotype ♀: W. Africa. In M.N.P.
- Sesia setodiformis*, 1892 : clxxiv. Viette, 1954 : 379. Holotype ♀: Madagascar, forêt de l'Est, Andrangoloaka (*A. Grandidier*). In M.N.P.

#### GELECHIIDAE

- Lita suaedicola*, 1906a : 54, pl. 3 : 5 (type figured). Holotype ♀: Ile d'Oleron. In M.N.P.
- Gelechia tripartitella*, 1907a : 79. Holotype ♂: Tunisie, Nefta, mai 1904 (*Daniel Lucas*). In M.N.P.

#### ZYGAENIDAE

- Asthenia ? flavicapilla*, 1880 : 345. Madagascar. Not found.
- Glaucopsis iridea*, 1892b : cxxxviii. Mabille & Vuillot, 1895 : 159, pl. 22 : 4. Holotype ♀: *Glaucopsis iridea* Mab. Sierra Leone 87 Pr.: Holotypus: coll. Staudinger. In Z.M.B.
- Glaucopsis pelidne*, 1890 : 35. Holotype ♂: *Gl. pelidne* Mab. Côte ouest [Sierra Leone]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Coll. Ch. Oberthür: Rothschild Bequest B.M. 1939-1. In B.M. (N.H.).
- Himantopterus fulveolans*, 1898 : 221. Holotype ♂: *Himant. fulveolans* Mab.: afr. cent. [afrique centrale]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Coll. Ch. Oberthür: Rothschild Bequest B.M. 1939-1. In B.M. (N.H.).
- Naclia ? erythrogaster*, 1892b : cxxxix. Mabille & Vuillot, 1895 : 148, pl. 21 : 1. Sierra Leone. Not found.

- Syntomis culiculina*, 1879a : 85. LECTOTYPE ♀: G. ? culiculina Mab. Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923; Coll. Ch. Oberthür: Rothschild Bequest B.M. 1939-1: Zygaenidae genitalia slide No. 1108. In B.M. (N.H.).
- Syntomis parvipuncta*, 1890 : 35. Holotype ♂: *Syntomis parvipuncta* P. Mab. Congo: parvipuncta Congo: Biblysia latipes Wlk. parvipuncta Mab. Zyg. ex D. Hamps.: Coll. Ch. Oberthür: Rothschild Bequest B.M. 1939-1: Zygaenidae ♂ genitalia slide No. 965. In B.M. (N.H.).
- Zygaena cyanoxantha*, 1893 : 57. Mabille & Vuillot, 1895 : 151, pl. 21 : 6. LECTOTYPE ♀: Abyssinia, Hildebr.: Origin: *Z. cyanoxantha* Mab. type: Genitalia preparation ZMB 6. In Z.M.B.
- Zygaena eudaemon*, 1885 : 57. Bernardi & Viette, 1961 : 142. Lectotype ♂: Algeria: Eudaemon Mab.: *felix mauritanica* Stdgr.: Et. Ent. XIII(1), pl. 7, fig. 70: Type Mabille: Ex Musaeo P. Mabille 1923. In M.N.P.
- Zygaena holoxanthina*, 1892b : cxxxviii. Mabille & Vuillot, 1895 : 159, pl. 22 : 5. Holotype ♀: *Zygaena holoxanthina* Mab. [Kenya] Kitui Mai, Hild. In Z.M.B.
- Zygaena mauritanica*, 1885 : 57. Bernardi & Viette, 1961 : 144. Lectotype ♀: Algeria: *Z. mauritanica* Mab.: Type Mabille: Ex Musaeo P. Mabille 1923: genitalia ♀, prep. P. Viette No. 3912. In M.N.P.
- Zygaena octo*, 1892b : cxxxviii. Mabille & Vuillot, 1895 : 150, pl. 21 : 5. Transvaal. Not found.
- Zygaena sardoa*, 1892c : cl. Holotype ♂: Sardinia. In M.N.P.

#### LIMACODIDAE

- Dasychira colini*, 1884 : 31. Holotype ♀: Africa: *Das. colini* Mab. Typ.: Ex musaeo P. Mabille 1923, Sénégal, 1 ♀ Holotypus. In Z.M.B.
- Limacodes strigatus*, 1879b : 139. Holotype ♂: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex coll. Oberthür: *Limacodes strigatus* P. Mab. Mad. [Madagascar]: Typus. In Z.M.B.
- Macroleptera tripunctata*, 1900 : 724. S. Africa. Not found.
- Narosa castanea*, 1900 : 724. Viette, 1954 : 382. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Parasa affinis*, 1890a : 52. Viette, 1954 : 382. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). Paratype ♀: Same data. Both in M.N.P.
- Parasa humilis*, 1890a : 53. Viette, 1954 : 382. Lectotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Parnia cambouei*, 1890a : 53. Viette, 1954 : 382. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P. (Espèce type du genre).
- Thilptocnemis barbipes*, 1900 : 724. Viette, 1954 : 382. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P. (Espèce type du genre).

#### THYRIDIDAE

- Endagria locuples*, 1879b : 134. Whalley, 1967:16. Neotype ♂: Madagascar (centre), Ambatalaona, 10. xii. 1932 (*Fountaine*), B.M. Slide 10102. In B.M. (N.H.).
- Siculodes opalinula*, 1880 : 347. Holotype ♀ (without abdomen): [Madagascar], *Siculodes opalinula*: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: *Rhodoneura opalinula* Mab. det J. D. Bradley 1952: type teste P. Viette. In B.M. (N.H.).
- Siculodes terreola*, 1880d : cviii. Madagascar. Not found.

## PYRALIDAE

- Actenia grandalis*, 1908 : 67. Tunisia. Not found.
- Alyta* [*sic*] *calligrammalis*, 1879b : 143. Holotype ♂ (without abdomen): [Madagascar], *Asopa comptalis* P. Mab.: *g. analyta* Led. n. sp. voisine de *l'albicillalis* Led. ex Amboina: This specimen is the type of *Analyta calligrammalis* P. Mab. 1879. Bull. Soc. Philomathique P. Viette. In B.M. (N.H.).
- Ambesa umbriferella*, 1906 : 35. Holotype ♂: Alger [Algeria], 3. In M.N.P.
- Bostra insignis*, 1900 : 742. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Bostra zonalis*, 1900 : 742. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Botys acosmialis*, 1879b : 144. Holotype ♂: [Madagascar], *Botys acosmialis* P. Mb.: *Ex musaeo* P. Mabille 1923: *Ex Oberthür* Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Botys bifenestralis*, 1880c : xxv. Madagascar. Not found.
- Botys chrysotalis*, 1880d : cviii. Madagascar. Not found.
- Botys holoxanthalis*, 1881 : lxii. Madagascar. Not found.
- Botys minutalis*, 1880 : 339. Madagascar. Not found.
- Botys monotretalis*, 1880 : 339. see Noctuidae.
- Botys stenopalis*, 1880c : xxv. Madagascar. Not found.
- Botys trigonalis*, 1890 : 51. Without locality; ? W. Africa. Not found.
- Botys venilialis*, 1880c : xxv. Madagascar. Not found.
- Cataclysta argyrochrysalis*, 1900 : 743. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Chalcidoptera albotessulalis*, 1900 : 744. Viette, 1954 : 380. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Cataclysta callichromalis*, 1879a : 94. Madagascar. Not found.
- Crambidion achroellum*, 1900 : 748. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P. (Espèce type du genre).
- Crambus biradiellus*, 1885 : 70. Holotype ♂: Archipel du Cap Horn, baie Orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Crambus nigroradians*, 1900 : 749. Comoro Is. Not found.
- Crambus punctistrigellus*, 1880c : xxvii. Viette, 1954 : 380. Holotype ♂: Madagascar (coll. Mabille). In M.N.P.
- Ctenus malacellus*, 1906 : 75, pl. 3 : 3. Holotype ♂: [Spain], Malaga. In M.N.P.
- Dichocrocis tigridalis*, 1900 : 745. Viette, 1954 : 380. Holotype (sans abdomen): Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Endotricha erythralis*, 1900 : 742. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Entephria septemnotata*, 1900 : 743. Viette, 1954 : 380. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Eudorea staudingeralis*, 1869 : 58, pl. 2 : 6. Holotype ♂: Corse, Bastia. In M.N.P.
- Euplocamus faedellus*, 1880c : xxvi. Madagascar. Not found.
- Euschraemon nigronaevalis*, 1906 : 36, pl. 3 : 4. Holotype (without head and tip of abdomen): Alger [Algeria], 3. In M.N.P.

- Euzophera pusilla*, 1906 : 35. Holotype ♀: Algeria: *Euzophera* sp. not in B.M. det. Hampson. In M.N.P.
- Glyphodes desmialis*, 1900 : 746. Without locality: Madagascar or Africa. Not found.
- Glyphodes malgassalis*, 1900 : 746. Madagascar. Not found.
- Heterographis costabella*, 1906 : 34. Holotype ♀: Algérie, Chott Asloundj, 29.3. In M.N.P.
- Heterographis rubroneurella*, 1908 : 67. Holotype ♂: Tunisie, Kébili, 10.vi.1906 (*Daniel Lucas*). In M.N.P.
- Heterographis thalerella*, 1908 : 68. Holotype ♀: Tunisie, Nefta, mai 1904 (*Daniel Lucas*). In M.N.P.
- Lygropia leucophanalis*, 1900 : 746. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Margarodes septempunctalis*, 1880c : xxv. Madagascar. Not found.
- Metoecis lepidocerella*, 1880 : 341. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♂: Madagascar. In M.N.P. (Espèce type du genre).
- Nacoleia dnopheralis*, 1900 : 745. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Nymphula luteivittalis*, 1880c : xxvi. Madagascar. Not found.
- Pachyzancla atropunctalis*, 1900 : 747. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Pachyzancla griseolineata*, 1900 : 747. Viette, 1954 : 381. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Paraponyx minoralis*, 1881 : lxiii. Madagascar. Not found.
- Perula asopialis*, 1900 : 742. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P. (Espèce type du genre).
- Phakellura imparivirgalis*, 1881 : lxii. Madagascar. Not found.
- Phakellura peridromella*, 1881 : lxiii. Congo. Not found.
- Phryganodes antongilensis*, 1900 : 744. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Phycis (Myelois) saturatella*, 1880c : xxvi. LECTOTYPE ♀: Madagascar. In M.N.P. Ce specimen, figuré par Ragnot (1893, pl. 22 : 15), a été trouvé dans le coll. Ragonot. Paralectotype ♂: *Acrobasis saturatella* Mab., Madag.: Ex musaeo P. Mabille 1923; Paravacini Coll. B.M. 1937-383. In B.M. (N.H.).
- Pionea rufeolalis*, 1900 : 747. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Pionea terminalis*, 1880 : 338. Madagascar. Not found.
- Platytes leucopleuralis*, 1900 : 748. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Prorodes leucothyralis*, 1900 : 746. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Pyralis cyanealis*, 1879b : 143. Madagascar. Not found.
- Pyrausta semilimbalis*, 1900 : 748. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Rhodophaea semistrigella*, 1908 : 68. Holotype ♂: Tunisie, Kébili, Zarcine, juin 1906: *Rhodophaea* sp. unnamed in the B.M. det. Hampson. In M.N.P.
- Sindris leucotriangula*, 1900 : 743. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.



- Spilomela trivirgalis*, 1880d : cviii. Madagascar. Not found.
- Stenia baltealis*, 1881 : lxii. Holotype ♂ (without head and abdomen): *S. baltealis* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Stenia pulchellalis*, 1880 : 337. Madagascar. Not found.
- Stenia uniflexalis*, 1880 : 336. Madagascar. Not found.
- Sylepta hemichionalis*, 1900 : 745. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Sylepta rubrifucalis*, 1900 : 736. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Syngamia longicornalis*, 1900 : 744. Viette, 1954 : 381. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Syngamia luteofusalis*, 1900 : 744. Viette, 1944 : 381. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Ulopeza crocifrontalis*, 1900 : 744. Viette, 1954 : 382. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Ulotricha lucasi*, 1907b : 308. Holotype ♂: Tunisie, Kébili, mai 1906. In M.N.P.

## DREPANIDAE

- Drepana tetrathyra*, 1900 : 724. Watson, 1965 : 132. Neotype ♂: [Madagascar], Diego Suarez, 8 March 1917 (*G. Melou*): Rothschild Bequest B.M. 1939-1; Photographed B.M. negative No. 31063. Drepanidae genitalia slide No. 608: *Crociniis tetrathyra* (Mabille), det. A. Watson 1963, Neotype. In B.M. (N.H.).
- Nidara croceina*, 1898 : 222. Watson, 1965 : 163. Lectotype ♀: [Madagascar]. Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

## GEOMETRIDAE

- Acidalia agrammaria*, 1900 : 738. LECTOTYPE ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898): agrammaria Mb.: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; Geometridae genitalia slide No. 5174. In B.M. (N.H.).
- Acidalia allardiata*, 1869 : 59, pl. 2 : 7. Holotype ♂: [Corsica] 7. In coll. Herbulot.
- Acidalia atromarginata*, 1869 : 61, pl. 2 : 3. LECTOTYPE ♂: *A. atromarginata* Mb.: type: [Corsica] Bastia 7. In coll. Herbulot.
- Acidalia cuspidata*, 1900 : 738. Viette, 1954 : 382. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P. Paralectotype ♀ (without abdomen) with additional data; cuspidata Mab. Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Acidalia faeculentaria*, 1880c : xxiii. LECTOTYPE ♀: Madag. [Madagascar]: *Ac. faeculentaria* Mb. Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Acidalia holobapharia*, 1900 : 739. LECTOTYPE ♂: Madagascar, Diego Suarez, 17. Ch. Alluaud, 1893: holobapharia Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; Geometridae genitalia slide No. 2784. In B.M. (N.H.).
- Acidalia honestata*, 1869 : 62, pl. 2 : 8. LECTOTYPE ♂: honestata Mb.: type: [Corsica], Bastia 1000 m. In coll. Herbulot.
- Acidalia limbolata*, 1900 : 738. Without locality. Not found.

- Acidalia punctistriata***, 1880c : xxiii. LECTOTYPE ♀: *Acidalia punctistrigata* [sic] Mab., Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: Similar data. Both in B.M. (N.H.).
- Acidalia rubrosignaria***, 1900 : 737. Viette, 1954 : 382. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Acidalia rufolutaria***, 1900 : 739. Holotype ♂: Madag. [Madagascar], Loucoubé, *Ebenau*, 80 : 101: Acid. rufolutaria [sic] Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Acidalia sparsipunctata***, 1900 : 738. Viette, 1954 : 382. Lectotype ♂ (sans abdomen): Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Acidalia spissilimbaria***, 1888a : lix. Holotype ♂: spissilimbaria Mb. type: Alger [Algeria]. In coll. Herbulot.
- Acidalia terrearia***, 1900 : 739. Holotype ♀ (without abdomen and right-side wings): Madag. [Madagascar], Loucoubé, *Ebenau* 80: Ac. terrearia Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Amaurinia erythraia***, 1893 : 62. Viette, 1954 : 382. Lectotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Anisodes landanata***, 1898 : 227. Holotype ♀ (without abdomen): [Angola], Landana: *Anisodes landanata* Mab.: *Anisodes landanata* Mab. Landana: *Anisodes landanata* Mab. Landana, af. occ. [Afrique occidentale]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Aspilates citrinarius***, 1885 : 67. Holotype ♂: Terre de Feu, baie orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Aspilates glyphicarius***, 1885 : 66. Holotype ♂: Terre de Feu, Ouchouaya (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Boarmia antelmara***, 1893 : 64. LECTOTYPE ♂ (without head and abdomen): Maurice: *Boarmia anthelmara* [sic] Mab., Ile Maurice: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Boarmia atrilunaria***, 1893 : 63. LECTOTYPE ♀: Maurice: *B. atrilunaria* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: Maurice: *Boarmia atrilunaria* Mab. paratype [det. L. B. Prout]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Boarmia basilaria***, 1890 : 47. Holotype ♂: *Boarmia basiliaria* Mab. afr. oc. [afrique occidentale]: *Boarmia basiliaria* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Boarmia buxicoloria***, 1873 : 490, pl. 15: 1, 2. LECTOTYPE ♂: *buxicoloria* Mb.: type: [France]. Aude 8. In coll. Herbulot.
- Bormia* [sic] *monogrammaria***, 1890 : 48. Holotype ♀: Zanbar [Zanquebar, historically E. African seaboard]: *Boarmia monogrammaria* [sic] Mab.: *Boarmia monogrammaria* Mab. afric.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Geometridae genitalia slide No. 1784. In B.M. (N.H.).
- Boarmia obsitaria***, 1890 : 47. Fletcher, 1967 : 91. Lectotype ♂: [Angola], Landana: *Boarmia obsitaria* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Geometridae genitalia slide No. 2135. Paralectotype ♂: [Angola], Landana, mars-av.: *Boarmia obsitaria* Mab. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Boarmia subocularia***, 1893 : 64. Holotype ♂ (without abdomen): afr. oc. [afrique occidentale]: *B. subocularia* Mab.: 237: *Boarmia subocularia* Mab. afr. occ. [afrique occidentale]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

- Caberodes hemigrammata**, 1898 : 227. Holotype ♂: Comores: not in B.M. [det. Hampson]: Caberodes hemigrammata Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Genitalia preparation No. 1932-15. In B.M. (N.H.).
- Caberodes insularia**, 1880c : xxii. Holotype ♀: Caberodes, Metrocampa insularia Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Caberodes russulata**, 1898 : 226. Holotype ♂: Comores: Unnamed in B.M. [det. Hampson]: Caberodes: Caberodes russata [sic] Mab. Comores: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Camptogramma monacmaria**, 1898 : 229. Holotype ♂ (without body): Ouest afr. [Ouest afrique]: Cid. monacmaria Mab. Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Figured in Seitz, Vol. xii. In B.M. (N.H.). True locality probably Australia: see L. B. Prout, 1939, in Seitz, Macrolepidoptera of the World, 12 : 242.
- Camptogramma polyacmaria**, 1898 : 230. LECTOTYPE ♂ (without abdomen): [Comoro Is.] Mayotte: C. polygrammaria [sic] Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M.(N.H.).
- Cidaria ectypata**, 1888a : lviii. Holotype ♀: Cidaria ectypata: [Tunisia] Gabés 16/8/8(?). In coll. Herbulot.
- Cidaria mutabilis**, 1885 : 69. Holotype ♂: Terre de Feu, baie orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Cidaria nanula**, 1900 : 737. Viette, 1954 : 382. Holotype ♀: Madagascar, Maevatanana (*J. Descorse*). In M.N.P.
- Cidaria perornata**, 1885 : 69. Holotype ♀: Terre de Feu, canal du Beagle (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Crociniis atricostaria**, 1898 : 229. Viette, 1954 : 382. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Diptychia rhodotenia**, 1898 : 226. Whalley, 1964 : 119. Madagascar. Not found.
- Ellopia dumonti**, 1906 : 32, pl. 3 : 2. Holotype ♂: Espagne, La Granja, 6. viii. 01 (*C. Dumont*). In M.N.P. Figured by Culot, 1922, Geometrides d'Europe, pl. 47 : 966.
- Endropia convexaria**, 1890 : 48. LECTOTYPE ♂: [Angola] Landana: End. convexaria: Endropia convexaria Mab. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Geometridae genitalia Slide No. 1578. Paralectotype ♂: Landana mars-av.: Endropia convexaria Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Endropia polychroaria**, 1890 : 48. LECTOTYPE ♂: [Angola] Landana mars-av.: Endropia polychroaria Mab.: Endropia polychroaria Mab. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Geometridae genitalia slide No. 1542. Paralectotype ♂: Landana: Endropia polychromaria [sic] Mab. Landana: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Ennomos hyadesii**, 1885 : 65. Holotype ♀ (without abdomen): Terre de Feu, baie orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Epione malefidaria**, 1880c : xxii. LECTOTYPE ♂: [Madagascar] Apicia malefidaria Mab.: Type: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M.(N.H.).
- Erosia sigillata**, 1898 : 228. Viette, 1954 : 382. Holotype ♀: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Eubolia obvallaria**, 1867 : 561, pl. 8 : 8. LECTOTYPE ♂: [Corsica]. Rotundo. 7. obvallaria P.M. In coll. Herbulot.
- Eucrostis albicornaria**, 1880a : clv. LECTOTYPE ♀: Madag. [Madagascar]: Eucrostis albicornaria Mab.: Madagascar albicornaria Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

- Eucrostis lilliputaria*, 1900 : 741. Viette, 1954 : 382. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Eucrostis nudilimbaria*, 1880a : clv. Holotype ♂: Corse, nudilimbaria Mb. In coll. Herbulot.
- Eucrostis rufocellata*, 1900 : 741. Viette, 1954 : 383. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Eucrostis rufostellata*, 1898 : 740. Madagascar. Not found.
- Eupithecia achilleata*, 1869 : 70, pl. 2 : 5. LECTOTYPE ♀: [Corsica] achilleata Mb.: type. In coll. Herbulot.
- Eupithecia chloerata*, 1870 : 96. France. Not found.
- Eupithecia cocciferata* Millière, var. *semitinctaria*, 1868 : 651, pl. 14 : 2. Corsica. Several syntypes in coll. Herbulot 'but none quite corresponding with description' (Herbulot in litt.).
- Eupithecia goossensata*, 1869 : 78. LECTOTYPE ♀: [France] goossensata Mab.: Type. In coll. Herbulot.
- Eupithecia hemileucaria*, 1880c : xxiv. Madagascar. Not found.
- Eupithecia innotata* f. [ssp.] *meridionalis*, 1869 : 73. Corsica and S. France. Not found.
- Eupithecia lentiscata*, 1869 : 75. Holotype ♂: lentiscata Mb.: Corse. In coll. Herbulot.
- Eupithecia nepetata*, 1869 : 68, pl. 2 : 4. LECTOTYPE ♀: nepetata: type: [Corsica], Bastia. In coll. Herbulot.
- Eupithecia pyrenaeata*, 1871 : 168. LECTOTYPE ♀: [France, Pyrenees] pyrenaeata Mb. type. In coll. Herbulot.
- Eupithecia santolinata*, 1871 : 168. Holotype ♀: santolinata Mab.: [France], Carcasson. 7. In coll. Herbulot.
- Eupithecia silenicolata*, 1867 : 562, pl. 8 : 9a, 9b. LECTOTYPE ♀: silenicolata Mab.: type: [Corsica], Bastia. In coll. Herbulot.
- Eupithecia unedonata*, 1868 : 649, pl. 14 : 3a, 3b, 3c. Corsica. Not found.
- Feronia zerenaria*, 1879a : 92. LECTOTYPE ♂: [Angola], Landana: Nolera zerenaria Mb. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♂: Nolera zerenaria Mab.: af. occ. [afrique occidentale]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Gynopteryx rubedinaria*, 1890 : 46. W. Africa. Not found.
- Hemerophila mauritiana*, 1893 : 62. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♂: I. Maurice (coll. Thierry-Mieg). In M.N.P.
- Hemithea dentata*, 1900 : 740. Without locality; Madagascar or Africa. Not found.
- Heterolocha indiscretaria*, 1898 : 227. Viette, 1954 : 383. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Hibernia marginaria* Borkhausen ab. *lesaunieri*, 1916 : 141. Holotype ♀: [France] Hyb. marginaria V. ♀ Lesaunieri Mab. In coll. Herbulot (ex coll. Lesaunier in coll. Lhomme).
- Hippoplectis distictaria*, 1885 : 67. Holotype ♂: Terre de Feu, Ouchouaya (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Hylemera fadella* see Arctiidae.
- Hylemera luteipes*, 1890 : 38. Without locality. ? W. Africa. Not found.
- Hyperythra miegii*, 1882a : 135. LECTOTYPE ♂: Madagascar: hyperythra miegii Mab. (le natur. 1882, p. 135), Madagascar, type original: Dognin Collection. In U.S.N.M.
- Hypochroma eugrapharia*, 1880 : 347. Holotype ♀: Madag. [Madagascar]: Hypochroma eugrapharia. P. Mb.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

- Hypochroma signifrontaria*, 1893 : 65. Holotype ♂: [Comoro Is.] Mayotte: Hyp. signifrontaria Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Larentia multivirgulata*, 1885 : 70. Holotype ♂: Terre de Feu, baie orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Larentia semilotaria*, 1885 : 70. Holotype ♂ (without abdomen): Terre de Feu, baie orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Leucochesias mesargyratea*, 1889 : 158, pl. 2 : 4. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Liodes homochromata*, 1869 : 57, pl. 2 : 9. Holotype ♂: Liodes homochromata M.: [Corsica], Bastia 6 (or 5). In coll. Herbulot.
- Lithostege fissurata*, 1888a : lviii. Holotype ♀: [Tunisia], Lithostege fissurata; type. In coll. Herbulot.
- Lobophora oculata*, 1885 : 68. Holotype ♀: Terre de Feu, baie orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Lobophora stenoptera*, 1885 : 68. Holotype ♂ (without abdomen): Terre de Feu, baie orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Macaria albogrisearia*, 1900 : 736. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♂: Madagascar, Maevatanana (*J. Decorse*). In M.N.P.
- Macaria cataleucaria*, 1898 : 229. [Mozambique], Delagoa, Zanzibar [historically E. African seaboard]. Not found.
- Macaria crasselimbaria*, 1880c : xxiii. Madagascar. Not found.
- Metrocampa ferruginaria*, 1898 : 231. Holotype ♀: Met. ferruginaria Mab. Comores: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Geometridae genitalia slide No. 2500. In B.M. (N.H.).
- Metrocampa punctuligera*, 1879a : 91. Holotype ♂ (without head and mended with ♀ abdomen): Metrocampa punctuligera P. Mab. [Angola] Landana: Metrocampa punctuligera Mab. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Metrocampa venerata*, 1879a : 91. Holotype ♀ (without abdomen): [Angola] Landana mars-av.: Metrocampa venerata P.M. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Nemoria aequaria*, 1898 : 231. LECTOTYPE ♀: Madagascar: N. aequaria Mab. Mad. Comor.: C. aequaria Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Geometridae genitalia slide No. 982. In B.M. (N.H.).
- Nemoria chlorinaria*, 1898 : 230. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Nemoria pallidularia*, 1880 : 333. Madagascar. Not found.
- Nemoria viridellaria*, 1898 : 231. Holotype ♀: Maurice: Nemor. viridellaria Mab. maurit. isl.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Nolera melanhiata*, 1891b : cxxvii. Gabon. Not found.
- Orgyia aurantia*, 1880 : 345 (now *Pseudocrocina*, **comb. n.**). Holotype ♂: [Madagascar] Orgyia aurantia P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Orsonoba trivittata*, 1900 : 737. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquers*, 1898). In M.N.P.
- Phorodesma leucochloraria*, 1880c : xxii. LECTOTYPE ♀: [Madagascar] Phor. leucochloraria Mb.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: Geometra Phorodesma leucochloraria Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).

- Phorodesma hemistrigata*, 1900 : 740. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Psamatodes arenularia*, 1880c : xxiv. Madagascar. Not found.
- Psodos quadrisectaria*, 1885 : 68. Holotype ♀: Terre de Feu, baie orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Salpis albipunctaria*, 1885 : 66. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Salpis antennata*, 1885 : 65. Holotype ♂: [Terre de Feu], Canal du Beagle, Ouchouaya (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Salpis scodionata*, 1885 : 66. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Scotosia syntegrammata* see Noctuidae.
- Selidosema oliveirata*, 1876 : cix. LECTOTYPE ♂: *S. oliveirata* Mb.: type: [Portugal] Coimbra. In coll. Herbulot.
- Stegania luteorubens*, 1900 : 737. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Stegania ruberata*, 1900 : 736. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Synneuria virgellata*, 1885 : 68. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Tephрина binaevata*, 1869 : 56, pl. 2 : 1, 2. LECTOTYPE ♂: [Corsica], *Halia binaevata* Mb. In coll. Herbulot.
- Tephрина inaequivirgaria*, 1890 : 49. LECTOTYPE ♀: En mer—Côtes du Sénégal 14.vii.: *Tephрина inaequivirgaria* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: Similar data. Both in B.M. (N.H.).
- Tephрина malesignaria*, 1880c : xxiii. Madagascar. Not found.
- Tephрина subcurvaria*, 1898 : 228. Holotype ♀: Ouest af. [Ouest afrique]: *T. subcurvaria* Mb.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Tephрина univirgaria*, 1880c : xxiv. Madagascar. Not found.
- Tephrosia griseoalbata*, 1893 : 63. Viette, 1954 : 383. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Thalassodes pallidulata*, 1880c : xxi. Madagascar. Not found.
- Thalassodes subreticulata*, 1900 : 740. Madagascar. Not found.
- Thalera atroviridaria*, 1880c : xxii. Madagascar. Not found.
- Triphosa directaria*, 1889 : 157, pl. 2 : 7. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Zamarada crystallophana*, 1900 : 741. Holotype ♀ (without abdomen): [W. Africa] *Zamarada crystallophana* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Zerene tricoloraria*, 1890 : 50. Holotype ♂ (without head): *Zeren, tricoloraria* Mab. Zambue. [Zanquebar, historically E. African sea-board]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

## URANIIDAE

- Micronia albidiorata*, 1893 : 62. Holotype ♂: afr. occ. [afrique occidentale]: 239: *Micronia albidiorata* Mab. afr. occ.: *Micronia albidiorata* Mab. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Micronia fasciata*, 1879a : 92. LECTOTYPE ♀: *M. fasciata* P. Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

*Micronia malgassaria*, 1879a : 92. Holotype ♀ (without abdomen): Madag. [Madagascar]; Madagascar: *Micronia malgassaria* Mab.: *Micronia malgassaria* P. Mb. Madagascar: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

*Micronia semifasciata*, 1880 : 335. Madagascar. Not found.

#### PTEROTHYSANIDAE

*Caloschemia monilifera*, 1879a : 86. Holotype ♂: Madagascar, de St. Augustin à Tuléar (*A. Grandidier*). In M.N.P.

#### LASIOCAMPIDAE

*Anchirithra punctuligera* see Lymantriidae.

*Bombix* [*sic*] *bilineata*, 1884 : 31. Senegambia. Not found.

*Bombyx datini*, 1888a : xlii. Tunisia. Not found.

*Bombyx hyadesi* see Saturniidae.

*Bombyx sordida*, 1879b : 138. Madagascar. Not found.

*Bombix* [*sic*] *subulva*, 1884 : 31. Senegambia. Not found.

*Borocera pelias*, 1879b : 138. LECTOTYPE ♂: Mad. [Madagascar]: *pelias* Bd. Mad.: Ex musaeo Drs. Boisduval: *Borocera Pelias* Mab.—Conte ♂ Lep. prod. soie, 6 fasc., Pl. XIII, fig. 7. In B.M. (N.H.).

*Borocera punctifera*, 1880c : xvii. Holotype ♀: [Madagascar] *Borocera punctifera* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

*Closterothrix gambeyi*, 1879a : 91. Holotype ♀: [Madagascar] *closterothrix gambeyi* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

*Gonometa argibasis*, 1893 : 59. Holotype ♀: Mozamb. [Mozambique]: *gonometa?* *argibas* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

*Lasiocampa gueneana*, 1880 : 314. Madagascar. Not found.

*Lasiocampa plagiogramma*, 1880 : 314. LECTOTYPE ♂: Madagascar: près de l'otus: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Genitalia preparation 1952-201. Paralectotype ♀: *Las. plagiogramma* ♀ Madag.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).

*Pachypasa directa*, 1893 : 58. Holotype ♀: *Pachypasa directa* Mab.: Dewitz Chinchoua [Gabon]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Genitalia preparation 1936-24. In B.M. (N.H.).

#### SATURNIIDAE

*Antheraea laestrygon*, 1878 : clxxx. Holotype ♀: *Antheraea laestrygon* [*sic*] februar: [Angola] Landana, Congo: *Antheraea laestrygonia* [*sic*] Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

*Bombyx hyadesi*, 1885 : 58. Holotype ♂: Terre de Feu, Onchomaya (*Hyades et Hahn*). In M.N.P.

*Perisomena cincta*, 1880 : 317. Holotype ♂: *Cincta* Bd., Goud., Madag. [Madagascar]: Ex Musaeo Drs. Boisduval: Coll. Ch. Oberthür: Rothschild Bequest B.M. 1939-1. In B.M. (N.H.).

*Saturnia (Bunaea) auricolor*, 1879b : 139. Madagascar. Not found.

*Saturnia diospyri*, 1880 : 316. Holotype ♂: Madagascar (coll. Boisduval—Coll. Ch. Oberthür). In M.N.P.

*Saturnia (Bunaea) fusicolor*, 1879b : 139. Madagascar. Not found.

## SPHINGIDAE

- Ambulyx grandidieri*, 1879b : 135. Holotype ♂: Madagascar (*Grandidier*). In M.N.P.
- Basiana stigmatica*, 1877 : 491. Holotype ♀: *Basiana stigmatica* P. Mab., Congo: *Brachyglossa stigmatica* Mb. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: 9445. In C.M.P.
- Chaerocampa argyropeza*, 1879b : 135. Holotype ♀: *argyropeza* P. Mb. Madagasc. [Madagascar]: *Ocyton tyrrius* Bdv. *argyropeza* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: 9859. In C.M.P.
- Chaerocampa bifasciata*, 1880 : 345. [Madagascar]. 'There is no specimen marked type, and B.P. Clark's notes list this as one of the species whose type was not received from Oberthür. However, I think it merely a case of the type having been overlooked because it was not (as were none of Mabille's) marked as a type. The following specimen is almost certainly the type. It is a female, fresh but with the body badly dermestid-eaten. It bears the following labels:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| (1) Gnath.<br>laticornis Btl.<br>(penned)          | (2) Gnathostypris<br>laticornis Btl.<br>(penned) | (3) 10156<br>(printed)   |
| (4) Clark<br>Collection<br>Acc. 12720<br>(printed) | (5) Ex musaeo<br>P. Mabille<br>1923<br>(printed) | (6) <i>Basiothia laticornis</i><br>Butler<br>(penned, B. P. Clark) |

What probably happened is that Mabille discovered the synonymy and merely removed his labels and substituted identification labels 'as corrected'. It is the only Mabille collection specimen in the series and its condition and appearance accord fully with the other Mabille specimens, of other species.' Dr. H. K. Clench, Carnegie Museum, Pittsburgh *in litt.* 19.iii. 1957.

- Macroglossa aesalon*, 1879c : 299. Holotype ♂ (without head: body badly dermestid-eaten): *Macroglossa Aesalon* P. Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923. 6066. In C.M.P.
- Macroglossa bombus*, 1880 : 347. Holotype ♀: Madagascar: *M. bombus* Mab. *Sta mario*: *Macroglossa Bombus* P. Mb. Madag.: 9919. In C.M.P.
- Pterogon obscurus*, 1880 : 344. Holotype ♂: [Madagascar], *Pterogon obscurus* Mab.: *Pterogon obscurus* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: 9884. In C.M.P.
- Sphinx oegrapha*, 1884a : clxxxvii. Holotype ♂: Madag. [Madagascar]: sp. *agrapha* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923. 9644. In C.M.P.

## NOTODONTIDAE

- Coenostegia barrei*, 1891 : cxlvii. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♀: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Coenostegia flavens*, 1891 : cxlvii. LECTOTYPE ♂: Menabé: *Coenostegia flavens* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ichthyura spissicornis*, 1900 : 723. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Notodonta angustipennis*, 1881 : lvi. Madagascar. Not found.
- Notodonta brunneomixta*, 1898 : 221. Holotype ♀: afr. cent. [afrique centrale]: Not in B.M. Notodont. *Harpyia brunneomixta* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Notodonta marmor* see Lymantriidae.
- Phalera lignitea*, 1900 : 723. S. Africa. Not found.
- Stauropus subnigrans*, 1898 : 221. E. Africa. Not found.



## LYMANTRIIDAE

- Anchirithra punctuligera**, 1880 : 315. (Now *Psalis*, see Collenette, 1955 : 171). Holotype ♂: [Madagascar]: *Anchirithra punctuligera* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Arctia (Areas) galactina**, 1880d : cvii. (Now *Dasychira* see Collenette, 1955 : 171). Holotype ♂: *Spilosoma areas galactina* Mb. Madag. [Madagascar]: *Dasychira: areas galactina* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Areas colini**, 1893 : 58. Viette, 1954 : 383. (Now *Dasychira*: see Collenette, 1955 : 171). Holotype ♀: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Cypra argenna**, 1900 : 725. Viette, 1954 : 383. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Dasychira colini** see Limacodidae.
- Dasychira fidjiensis** Mabille & Vuillot, 1890 : 5, pl. 1 : 2. Holotype ♂: Fidji Ins.: *Dasychira fidjiensis* Mab. et Vuill. ♂ Type Fidji: Rothschild Bequest B.M. 1939-1. In B.M. (N.H.).
- Dasychira ochroderoea**, 1898 : 223. Holotype ♀: Madagascar, Diego Suarez, 1893 (*Ch. Alluaud*): *D. ochroderoea* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Dasychira phaeosericea**, 1884a : clxxxix. Holotype ♀ (without abdomen): Madag. [Madagascar]: *Dasychira phaeosericea* Mab.: *Das phaeosericea* Mab. Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Dasychira platyptera**, 1885 : 58. Magellan Is. Not found.
- Dasychira suarezia**, 1898 : 222. Holotype ♂: Madagascar. Diego-Suarez, 7.1893 (*Ch. Alluaud*): *Dasychira* not in B.M.: *Dasych. suarezia* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hylemera fadella** see Arctiidae.
- Hylemera luteipes** see Geometridae.
- Laelia diaphanella**, 1898 : 223. Holotype ♀ (without head and abdomen): Madag. [Madagascar]: *Leucoma diaphanella* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Laelia leucolepis**, 1898 : 223. Central Africa. Not found.
- Liparis barica**, 1879a : 90. Viette, 1954 : 384. Lectotype ♂: Madagascar, de Saint-Augustin à Tuléar (*A. Grandidier*, 1867). In M.N.P.
- Liparis binotata**, 1880d : cvii. Holotype ♀: Madag. [Madagascar]: *Liparis binotata* P. Mab.: *Liparis binotata* P. Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Liparis heptasticta**, 1879a : 90. Holotype ♂: *Lip. hexasticta* [*sic*] Mab.: *L. heptasticta* Mb. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Liparis melanocera**, 1879a : 89. Holotype ♂ (without abdomen): *Laelia melanocera* Mab. Madag. [Madagascar]: *Leucoma melanocera* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Liparis nolana**, 1882a : 134. Madagascar. Not found.
- Liparis rhodophora** see Noctuidae.
- Liparis vitrina**, 1879a : 90. Holotype ♀ (without abdomen): [Madagascar], *Liparis vitrina* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Lymantria rufofusca**, 1900 : 725. Viette, 1954 : 384. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

- Notodonta marmor**, 1880c : xvii. (Now *Dasychira*; see Collenette, 1955 : 171 as *marmorina*).  
Holotype ♀: Mad. [Madagascar]: *Notodonta marmorina* [sic] (Clostera) Mab.: *Notodonta marmorina* [sic] Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Orgyia aurantia** see Geometridae.
- Orgyia** [sic] **ramburii**, 1867 : 557, pl. 8 : 6. LECTOTYPE ♂: Corse. In M.N.P.
- Orgyia** (*Dasychira*) **velutina**, 1879a : 90. Holotype ♂: [Madagascar]: *D. velutina* Mb. liparis sp.: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Porthesia depauperata**, 1880c : xvii. LECTOTYPE ♀ (without abdomen): Madag. [Madagascar]: *Porthesia depauperata* Mab. Madag.: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

### ARCTIIDAE

- Amblythyris radama**, 1879b : 137. LECTOTYPE ♀: Rhadama Bd. Madagascar: Ex musaeo Dris. Boisduval: Mad. [Madagascar]: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Arctia bicolor** see Noctuidae.
- rcia** (*Areas*) **galactina** see Lymantriidae.
- Bizone grandis**, 1879b : 136. Madagascar. Not found.
- Deiopea** [sic] **diva**, 1880 : 305. Madagascar. Not found.
- Dejopeia** [sic] **heterochroa** see Hypsidae.
- Deiopeja** [sic] **serrata**, 1879 : 21. Madagascar. Not found.
- Eugoa pluripunctata**, 1900 : 725. Viette, 1954 : 386. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Hylemera fadella**, 1882 : 100. Madagascar. Not found.
- Lithosia amaurobapha**, 1900 : 725. Viette, 1954 : 386. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Lithosia bijuga**, 1899a : 270. Viette, 1954 : 386. Holotype ♀: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Lithosia catenata**, 1900 : 726. Viette, 1954 : 386. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Lithosia cirrochroa**, 1900 : 726. Madagascar. Not found.
- Lithosia cocciniceps**, 1884a : clxxxix. Madagascar. Not found.
- Lithosia** (*Paedia*) **costimacula**, 1879a : 87. Congo. Not found.
- Lithosia erythropleura**, 1879c : 302. Holotype ♂: Typicum Specimen: Madagascar: *Lith. erythropleura* Mab.: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Lithosia flammea**, 1885 : 57. Madagascar. Not found.
- Lithosia imitans**, 1879a : 87. Birket-Smith, 1965 : 99. Neotype ♀: Angola (*Dr. K. Jordan*): Fazenda Congulu, Amboim district, 7-800 m., 17-22. iv. 1934. Rothschild Bequest Brit. Mus. 1939-1. *Lithosia imitans* Mabille, neotype ♀, J. Birket-Smith sel. 1965. In B.M. (N.H.).
- Lithosia mauritia**, 1899 : 220. LECTOTYPE ♀: *L. mauritia* Mab., Maurice: Mauritius 99-34 [Presented to B.M. (N.H.) by P. Mabille, 1899]. In B.M. (N.H.).
- Lithosia pallidicosta**, 1900 : 726. Viette, 1954 : 387. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Lithosia sanguinolenta**, 1879a : 87. Madagascar. Not found.

- Lithosia simulans*, 1879a : 87. Birket-Smith, 1965 : 101. Neotype ♂: Angola (*Dr. K. Jordan*): Fazenda Congulu, Amboim district, 7-800 m., 7-11. iv. 1934: Arctiidae genitalia slide No. 601: Rothschild Bequest Brit. Mus. 1939-1: *Lithosia simulans* Mabille. Neotype ♂, J. Birkett-Smith sel. 1965. In B.M. (N.H.).
- Lithosia subrosea*, 1898 : 220. Madagascar. Not found.
- Lithosia umbriger*, 1900 : 726. Viette, 1954 : 387. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Megacraspedum quinquepunctatum*, 1900 : 727. Without locality; Madagascar or Africa. Not found.
- Mitlochrista ochrorubens*, 1900 : 726. Viette, 1954 : 387. Holotype ♂ (sans abdomen): Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Nudaria m-nigrum*, 1899a : 270. Viette, 1954 : 387. Holotype ♀: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Phryganopsis plumosa*, 1900 : 726. Viette, 1954 : 387. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Spilosoma aspersa*, 1879a : 89. LECTOTYPE ♀: Madag. [Madagascar]: *Spil. aspersa*: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Spilosoma melanimon*, 1880c : xvi. Holotype ♀ (not ♂): [Madagascar]. *Arctia melanimon* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M.(N.H.).
- Spilosoma robleti*, 1893 : 57. Viette, 1954 : 387. Lectotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.

## SYNTOMIDAE

- Aglaope ? perpusilla*, 1880 : 348. Oberthür, 1925 : 67, pl. 592 : 5030. Griveaud, 1964 : 56, pl. 1 : 31. Holotype ♂: Madag. [Madagascar]: *Aglaope perpusilla* Mab.: *Micronaclia simplex* Btl.? *perpusilla* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: figuré dans le volume 22, 2<sup>e</sup> partie: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Glaucopis iridea* see Zygaenidae.
- Glaucopis pelidne* see Zygaenidae.
- Naclia ? erythrogaster* see Zygaenidae.
- Naclia quadrimacula*, 1879a : 85. Oberthür, 1893 : 2. Griveaud, 1964 : 84, pl. 1 : 53. Holotype ♂: Quadrimacula B. Madag. [Madagascar]: Ex Musaeo Dris. Boisduval: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Naclia tenera*, 1879a : 85. Griveaud, 1964 : 43, pl. 1 : 19. Holotype ♂ (without abdomen): Tenera B. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo Dris. Boisduval: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Naclia trimacula*, 1879a : 85. Oberthür, 1893 : 4. Griveaud, 1964 : 84, pl. 1 : 53. Holotype ♂: Trimacula B. Madag. [Madagascar]: Ex Musaeo Dris. Boisduval: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Syntomidae genitalia slide No. 55. In B.M. (N.H.).
- Naclia tristigma*, 1893 : 58. Mabille & Vuillot, 1895 : 148, pl. 21 : 2. Holotype ♀: Sierra Leone, 87-88, *Preuss.* In Z.M.B.
- Syntomis anapera*, 1879a : 85. Griveaud, 1964 : 30. Lectotype ♀: *anapera* Mab. Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Syntomidae genitalia slide No. 49. In B.M. (N.H.).
- Syntomis butleri*, 1882a : 134. Viette, 1954 : 387. Lectotype ♀: Madagascar (coll. Thierry-Mieg). In M.N.P.
- Syntomis culiculina* see Zygaenidae.

- Syntomis curtiplaga*, 1890 : 35. Holotype ♂: curtiplaga Mb. Congo: curtiplaga P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Syntomis interniplaga*, 1890 : 35. LECTOTYPE ♀: S. interniplaga Mab. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: Syntomis interniplaga Mab. Congo: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Syntomis muscella*, 1884a : clxxxviii. Griveaud, 1964 : 34, pl. 1 : 11. Holotype ♀: Micronaclia muscella Mb. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923 : Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Syntomidae genitalia slide No. 43. In B.M. (N.H.).
- Syntomis parvipuncta* see Zygaenidae.
- Synthomis* [sic] *pterophorina*, 1892 : cxxxix. Mabille & Vuillot, 1895 : 152, pl. 21 : 7. Holotype ♂: Verulam, Natal, *Spiller*. In Z.M.B.
- Syntomis quinquemacula*, 1882 : 134. Griveaud, 1964 : 112, pl. 1 : 76, 77. Lectotype ♀: 5 macula Mab. Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Syntomis reducta*, 1879a : 84. Griveaud, 1964 : 26, pl. 1 : 6. Holotype ♂: Reducta B. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo Dris. Boisduval: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Syntomidae genitalia slide No. 50. In B.M. (N.H.).
- Syntomis rubicunda*, 1892b : cxxxix. Mabille & Vuillot, 1895 : 153, pl. 21 : 8. LECTOTYPE ♀: Kamerun int., Barombi Station, 1889 (*Preuss*): Origin: Coll. Staudinger : Type: Syntomis rubicunda Mab. In Z.M.B.
- Syntomis zygaenoides*, 1884 : clxxxviii. Griveaud, 1964 : 26. Lectotype ♂: [Madagascar]. Zygaenoides Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Syntomidae genitalia slide No. 60. In B.M. (N.H.).
- Thyretes melinos*, 1890 : 37. Holotype ♀: Thyr. melinos Mb. [Ivory Coast], Assinie: Metarctia invaria Wlk. [Hampson det.]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Syntomidae genitalia slide No. 81. In B.M. (N.H.).

#### HYPSIDAE

- Aganais mecynoides*, 1879c : 295, pl. 6 : 3. Madagascar. Not found.
- Callimorpha incomparabilis*, 1892 : clxxiv. Holotype ♀: Call. incomparabilis Mab. Guinea sept.: C. incomparabilis Mab. Cote occ. Afric. [Côte occidentale Afrique]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Chelonia rubriceps*, 1879a : 88. LECTOTYPE ♀: Caryatis rubriceps Mab. Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Dejopeia* [sic] *heterochroa*, 1879a : 88 (Now *Callicereon*, **comb. n.**). LECTOTYPE ♀ (without abdomen): [Madagascar], Callimorpha heterochroa: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Euchelia ragonoti*, 1880 : 348. Holotype ♀ (not ♂ as recorded): [Madagascar], Euchelia ragonoti Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Genitalia preparation 1956-779. In B.M. (N.H.).
- Eusemia vectigera*, 1882 : 100. Holotype ♂: [Madagascar], Ag. vectigera Mab.: Lymantriidae. Fodinoidea maculata Butl. Ex D. Hampson = A. vectigera Mb.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypsa ambusta* see Agaristidae.
- Hypsa chionea*, 1879a : 86. Congo. Not found.
- Hypsa concinnula* see Noctuidae.

*Nichthemera* [*sic*] *biformis*, 1879a : 87. LECTOTYPE ♂: *Leptosoma biformis* P.M. ♂: *Nychthemera* [*sic*] *Mabillei* Butl. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: *Nichthemera biformis* ♂ Mab. Soc. Zool. Franc. vol. III—1879, p. 87: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: *L. biformis* Mab.: *Nychthemera* [*sic*] *biformis* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923. Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).

*Nychthemera* [*sic*] *rasana*, 1879c : 304. LECTOTYPE ♀: Madagascar: *N. rasana* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

### NOLIDAE

*Celama geminata*, 1900 : 727. Viette, 1954 : 386. Holotype ♂ (sans tête et abdomen): Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

*Nola picturata*, 1899a : 270. Viette, 1954 : 387. Holotype ♀: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.

### NOCTUIDAE

*Acantholipes angulina*, 1881 : lxi. Holotype ♂: [Angola], Congo, Landana. In M.N.P.

*Acantholipes maculifera*, 1881 : lx. Holotype ♀: [Angola], Congo, Landana. In M.N.P.

*Achaea oedipodina*, 1879b : 140. Viette, 1954 : 384. Lectotype ♀: Madagascar, de Saint-Augustina à Tuléar (*A. Grandidier*, 1867), (coll. Mabille). In M.N.P.

*Achaea orea*, 1881 : lviii. LECTOTYPE ♂: Madag. [Madagascar]: *ach. orea* Mab. Madag. [Madagascar]: *Achaea dejeani* Boisd. not ezea Cram. [det. Hampson]: *Achaea dejeani* Bdv. = *orea* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♂: Madagascar: *achaea orea* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).

*Achaea sinistra*, 1880c : xix. Holotype ♂: Madag. [Madagascar]: *Achaea sinistra* Mab. n.sp.: *Achaea boris* Geyer [Hampson det.]: *Achaea boris* Gey. *sinistra* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

*Achaea umbrigera*, 1898 : 224. LECTOTYPE ♂: Maurice: *achaea umbrifera* [*sic*] Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀ with similar data labels. Both in B.M. (N.H.).

*Acontia chloromelana*, 1890 : 39. Holotype ♀: En mer Côte du Sénégal 14.vii.: *ac. chloromelana* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M.(N.H.).

*Acontia malgassica*, 1881 : lx. Viette, 1954 : 384. Holotype ♀: Madagascar (coll. Mabille). In M.N.P.

*Aconthia* [*sic*] *miegii*, 1882a : 134. Madagascar. Not found.

*Acontia microcycla*, 1879a : 94. Madagascar. Not found.

*Acontia microptera*, 1880 : 321. Viette, 1954 : 384. Lectotype ♀: Madagascar (coll. Mabille). In M.N.P.

*Agrotis aethes*, 1885 : 62. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.

*Agrotis aphe*, 1885 : 61. LECTOTYPE ♀: Algeria: *Agrotis aphe* Mab. Paralectotype ♂: Algeria. Both in M.N.P.

*Agrotis bicolor*, 1885 : 59. Holotype ♀: Terre de Feu, B. orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.

*Agrotis carbonifera*, 1885 : 60. LECTOTYPE ♂: Terre de Feu, Oushouaia (*Hyades & Hahn*). Paralectotype ♀: Terre de Feu, canal du Beagle (*Hyades & Hahn*). Both in M.N.P.

- Agrotis consentanea*, 1880d : cvii. Holotype ♂: *Agrotis consentanea* Mab. [Madagascar], Foulpointe: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Agrotidae genitalia slide No. 1851. In B.M. (N.H.).
- Agrotis dianthaeciae*, 1885 : 60. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Agrotis digramma*, 1885 : 60. Holotype ♂: Terre de Feu (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Agrotis frigida*, 1885 : 61. Holotype ♂: Terre de Feu, B. orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Agrotis gravida*, 1885 : 59. Holotype ♀: Terre de Feu (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Agrotis ingouffii*, 1885 : 59. Holotype ♀: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Agrotis pudens*, 1900 : 728. Holotype ♀: Comores: *Agrotis pudens* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3: Noctuidae genitalia slide No. 3021. In B.M. (N.H.).
- Agrotis rugifrons*, 1888a : xlii. Holotype ♂ (without head): Tunisie, Gabés, 29.10.1885. In M.N.P.
- Agrotis sabura*, 1888a : xlii. Holotype ♂: Tunisie, Gabés, 29.10.1885. In M.N.P.
- Agrotis typhlina*, 1885 : 58. LECTOTYPE ♂: Terre de Feu, B. orange (*Hyades et Hahn*). Paralectotype ♀: same data. Both in M.N.P.
- Agrotis xanthostola*, 1885 : 61. Holotype ♂: Terre de Feu, B. orange (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Alamis rufomixta*, 1890 : 41. Holotype ♀: En mer—Côtes du Sénégal. 14.vii.: *Alamis rufomixta* Mb.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ametropalpis nasuta*, 1884a : clxxxix. Madagascar. Not found.
- Anarta trisema*, 1885 : 64. Holotype ♂: Terre de Feu (*Hyades et Hahn*). In M.N.P.
- Ancistris saturnina*, 1898 : 225. Madagascar. Not found.
- Anophia oligomelas*, 1890 : 43. Holotype ♀ (without abdomen): [W. Africa], *A. oligomelas*, Mb.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Anthophila heterogramma*, 1881 : lxi. Congo. Not found.
- Anthophila i-graecum*, 1881 : lxi. Viette, 1954 : 384. Holotype ♀: Madagascar (coll. Mabille). In M.N.P.
- Anthophila subolivalis*, 1893 : 60. Viette, 1954 : 384. Lectotype ♂: Madagascar, Tamatave (coll. Joannis). In M.N.P.
- Apamea lebruni*, 1885 : 63. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Arctia bicolor*, 1879b : 137. (Now *Hypsiforma*: see Viette, 1954a : 13). Holotype ♀: bicolor Mb. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Athyrma saalmulleri*, 1881 : lvii. LECTOTYPE ♀: [Madagascar]. *Oph. noctuiformis* Mab.: resemble à adjutrix Cr. 272 ex Surinam: *Athyrma saalmulleri* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Athyrma trispila*, 1890 : 45. Holotype ♀: *Athyrma trispila* Mab. [Ivory Coast], Assinie: *Ath. trispila* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Axylia bucephalina*, 1885 : 63. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Bleptina tenebrosa*, 1900 : 735. Holotype ♂: afr. c. [afrique centrale]: not in B.M. [det. Hampson]: *Bleptina tenebrosa* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

- Bolina agrotidea*, 1880 : 346. Holotype ♂: [Madagascar]. *Bolina agrotidea* P. Mab.: ... *Anophia* Gn.: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Botys monotretalis*, 1880 : 339. Hampson, 1910 : 468. LECTOTYPE ♀ (without body): [Madagascar] *monotretalis* Madag.: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Bryophilopsis tarachoides*, 1900 : 729. Viette, 1954 : 384. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys* 1898). In M.N.P.
- Calophasia bicolor*, 1889 : 153. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P. This specimen previously described as type of *Calophasia simplex*.
- Calophasia simplex*, 1885 : 64. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P. This specimen later redescribed as type of *Calophasia bicolor*.
- Capnodes acrosema*, 1900 : 734. Madagascar. Not found.
- Caradrina hispanica*, 1906 : 31, pl. 3 : 1. Holotype ♀: Espagne, La Granja, vii. 1898 (*C. Dumont*). In M.N.P.
- Catephia cazeti*, 1893 : 59. Viette, 1954 : 384. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Catephia melanis*, 1890 : 43. Holotype ♀: [Ivory Coast, Assinie]. *Cat. melanis* Mab.: Voir *Cocytodes maura* Holl. in *Hamps.* v. xii. p. 261; Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Catocola gitana*, 1885 : 64. Holotype ♂: [Spain], Andalousie, Malaga. In M.N.P.
- Coelophoris trilineata*, 1900 : 733. Viette, 1954 : 384. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys* 1898). In M.N.P. (Espèce type du genre).
- Cucullia syrtana*, 1888a : li. Holotype ♀: Tunisie, Gabés. In M.N.P.
- Cyligramma amblyops*, 1891a : xc. LECTOTYPE ♂: ♂: [W. Africa]. *Cyl. amblyops* Mab. type: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: ♀: [W. Africa]. Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Cyligramma concors*, 1881 : lix. LECTOTYPE ♂: ♂: [Madagascar]. *Concors* Mab. ♂: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: *concors* ♀: *Cyligramma concors* Mab. *disturbans* W. Madagasc.: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Daphnaeura smithii*, 1880b : clxxiv. Madagascar. Not found.
- Daxata trisignata*, 1900 : 734. Viette, 1954 : 384. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Dianthaecia magellana*, 1885 : 64. Holotype ♂: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Diatenes merulina*, 1890 : 42. LECTOTYPE ♂: Madag. [Madagascar]: *Diat. merulina* Mab.: *Diatenes merulina* Mab. Madag. [Madagascar]: = *globulifer* [det. Hampson]: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♂: Madag. [Madagascar]: *D. merulina* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Earias crocea*, 1900 : 727. Comoro Is. Not found.
- Egnasia macularia*, 1900 : 733. Holotype ♂ (without abdomen): Madag. [Madagascar] (not Maurice as recorded): *Egnasia* not in B.M. [det. Hampson]: *Egnasia macularia* (*sic*) Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Egnasia obscurata*, 1898 : 226. Madagascar. Not found.
- Epimecia quadrivirgata*, 1888a : li. Holotype ♂: Tunisie, Gabés. In M.N.P.

- Epimecia subtilis*, 1888a : li. Holotype ♀: Tunisie, Gabés. In M.N.P.
- Erastria acrochiona*, 1900 : 729. Holotype ♀: Afr. or. [Afrique orientale]. In M.N.P.
- Erastria apicimacula*, 1880c : xviii. Viette, 1954 : 384. Lectotype ♂: Madagascar (coll. Mabilles). In M.N.P.
- Erastria leucoglène*, 1880c : xviii. Viette, 1954 : 384. Lectotype ♀: Madagascar, Nossy-Bé (coll. Mabilles). In M.N.P.
- Erastria quadrimacula*, 1900 : 729. LECTOTYPE ♂: [S. Africa]. *Erastria 4 macula* Mab.: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♂: [S. Africa]. *Erastria* sp. not in B.M. [det. Hampson]: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Euclidia remigina*, 1884a : cxci. LECTOTYPE ♂: Madag. [Madagascar]: *Euclidia remigioides* Mab.: *Remigiodes remigina* Mab.: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♂ (without body): *Euclidia remigiodes* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Euperia nagaloo* Mabilles & Vuillot, 1890 : 8, pl. 1 : 7. Fiji. Not found.
- Euplexia ochrargyra*, 1900 : 727. Viette, 1954 : 385. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Eurhipia rosea* Mabilles & Vuillot, 1890 : 6, pl. 1 : 4. Congo. Not found.
- Eutelia gilvicolor*, 1900 : 732. Holotype ♂ (without head): Afr. or. [Afrique orientale]: *Eutelia* not in B.M. [det. Hampson]: *Eutelia gilvicolor* Mab.: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eutelia vulgaris*, 1900 : 731. Holotype ♂ (without abdomen): [Mozambique], Delagoa: *Eutelia* sp. unnamed in B.M. [det. Hampson]: *Eutelia vulgaris* Mab. Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Exophila flexuaris*, 1890 : 40. Holotype ♀ (without abdomen and hind wings): [W. Africa]. *Exophila flexuaris* Mab.: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Grammodes rhodotaenia*, 1879b : 141. Holotype ♀: Madag. [Madagascar]: *Gramm. rhodotaenia* P. Mab.: *Grammodes rhodotaenia* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Gyrtona erebenna*, 1900 : 731. Holotype ♂ (wings from left side and abdomen missing): Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898): *Gyrtona erebenna* Mab.: 24: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hadena inquinata*, 1888a : xliii. Holotype ♀: Tunisie, Gabés, 29. 10. 1885. In M.N.P.
- Hadena tetragona*, 1885 : 63. Holotype ♂: Terre de Feu, canal du Beagle (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Halia serralis*, 1880c : xxi. Holotype ♀: Mad. [Madagascar]: *Halia serralis* Pierron Ste Maria: *Halia serralis* Madag [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Heliothis variabilis*, 1890 : 39. Holotype ♂: Côte du Sénégal, 14. vii. In M.N.P. [Not a *Heliothis*, but a *Quadrifine*].
- Herminia campanalis*, 1880d : cviii. Holotype ♂ (without tip of abdomen): [Madagascar]. *Herminia campanalis* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Herminia periplocalis*, 1880c : xxi. Holotype ♂ (not ♀ as recorded): *Hypena periplocalis* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923; Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).



- Homoptera terrena*, 1882 : 100. Viette, 1954 : 385. Holotype ♂: Madagascar (coll. Thierry-Mieg). In M.N.P.
- Hoporina croceago* Schiff. var. *corsica*, 1868 : 641. Corsica. Not found.
- Hydroecia hucherardi*, 1907 : 37. France. Not found.
- Hypaena* [*sic*] *gravalis*, 1898 : 225. Holotype ♂: Maurice: Hypena not in B.M. [det. Hampson]: Hypena *gravalis* Mb. Ile Maurice: Hyp. *gravalis* Mab.: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypena albistriga*, 1900 : 736. Holotype ♂ (without abdomen): Afric. or. [Afrique orientale]: Hypena not in B.M. [det. Hampson]: Hypena *albistriga* Mab. afr. or. [Afrique orientale]: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypena angulalis*, 1880c : xx. Holotype ♂ (without abdomen): Hypena *angulalis* Pierron Ste Maria: Hypena *angulalis* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypena contortalis*, 1880c : 20. LECTOTYPE ♀ (not ♂ as recorded, and without abdomen): Madag. [Madagascar]: Hypena *contortalis* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypena glyptalis*, 1880c : xix. Holotype ♀: Hypena *glyptalis* Pierron Ste Maria: Hypena *glyptalis* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypena hemigrammalis*, 1880c : xx. Holotype ♂ (without hind wings and abdomen): Hypena *hemigrammalis* Mab.: Hypena *hemigrammalis* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypena lyperalis*, 1880c : xix. LECTOTYPE ♂: Madag. [Madagascar]: Hypena *lyperalis* Mb. Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypena ophiusinalis*, 1879b : 142. Holotype ♂: Hypena *ophiusalis* [*sic*] Mab. Madag. [Madagascar]: Hypena *ophiusinalis* P. Mad.: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypopyra malgassica*, 1879a : 93. LECTOTYPE ♀ (without abdomen): [Madagascar]. Hypopyra *malgassica* Mab.: Hyp. *malgassica* Mab.: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Hypopyra megalesia*, 1880 : 346. LECTOTYPE ♂: [Madagascar]. Hypopyra *megalesia* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀ (without abdomen): [Madagascar]. Resemble à *H. grandaeva* F.R. 115-11 M. . . : Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Hypocala florens*, 1880 : 324. Viette, 1954 : 385. Lectotype ♂: Madagascar, de Saint-Augustin à Tuléar (*A. Grandidier*, 1867). In M.N.P.
- Hypsa concinnula*, 1879a : 85; 1879c : 294, pl. 6 : 2 (now *Mazuca*). Coast of E. Africa. Not found.
- Ilurgis subsignata*, 1900 : 735. Madagascar. Not found.
- Liparis rhodophora*, 1879b : 137. (Now *Melapera comb. n.*). LECTOTYPE ♂: Stilpnotia *rhodophora* Mab., Mad. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Madopa parallelalis*, 1880c : xxi. Holotype ♀: Madopa *parallelalis* Mab. Madag. [Madagascar]: (twice). Ex musaeo P. Mabilles 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Marmorinia argyrographa*, 1893 : 61. Viette, 1954 : 385. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.

- Metachrostis megalena**, 1900 : 730. Holotype ♂: Afr. or. [Afrique orientale, not 'australe' as recorded]: *Metachrostis* sp. not in B.M. [det. Hampson]: *Metachrostis megalena* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Metaptya sericina**, 1900 : 730. Viette, 1954 : 385. Lectotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Micra lacteola**, 1880c : xix. LECTOTYPE ♂: Mad. [Madagascar]: *lacteola*: *Micra lacteola* Mab. Mad. [Madagascar]: *Negeta* Wlk. *luminosa* Wlk. = *micra lacteola* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: Mad. [Madagascar]: *Micra lacteola* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Micra parva** Hübner ab. **rubefacta**, 1869 : 56. Holotype ♂: Corse. In M.N.P.
- Micraeschus leptinia**, 1900 : 731. Viette, 1954 : 385. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Moma aequatoria**, 1879d : 26. Mabille & Vuillot, 1890 : 6, pl. 1 : 3. Holotype ♀: [Congo]. *Moma aequatoria* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Naranga cyclina**, 1900 : 730. Without locality; Madagascar or Africa. Not found.
- Naranga nephelea**, 1900 : 731. Holotype ♂: [Madagascar or Africa]. *Naranga nephelea* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Noctua kermesina**, 1869 : 55, pl. 2 : 10. Holotype ♂: Corse. In M.N.P.
- Nodaria turpalis**, 1900 : 735. Viette, 1954 : 385. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Nonagria cyrnaea**, 1867 : 559, pl. 8 : 7. Holotype ♂: Corse. In M.N.P.
- Odontina pierronii**, 1880c : xviii. Holotype ♂: [Madagascar]. *Odontina pierronii* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ophiodes minians**, 1884a : cxc. Holotype ♂: Madag. [Madagascar]: *Ophiodes minians* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ophiodes orthogramma**, 1879b : 140. LECTOTYPE ♂: [Madagascar]. *Ophiodes orthogramma* Mab.: *Achaea orthogramma* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♂: *Ophiodes orthogramma* P. Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Ophiodes pelor**, 1881 : lvii. Holotype ♂: *Ophiodes pelor* P. Mab.: *Achaea lienardi* Boisd. Madag. [Madagascar], *Anua pelor* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ophiodes ponderosa**, 1880 : 346. Holotype ♂ (not ♀ as recorded): Madagascar: *Ophiodes ponderosa* Mab. Madagascar, St. Marie 1879, Ex. D. Granbey: *Ophisma trapezoides* Gn. Madag., *Anua coronata* Fbr. = *ponderosa* Mab.: = *coronota* Fabr. [det. Hampson]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ophisma leucochiton**, 1884a : cxc. Holotype ♂: Madag. [Madagascar]: *O. leucochiton* Mab.: *Ophiodes leucochiton* Mab. Mad. [Madagascar]: *Ophisma allardi* Ob. 1878, pl. 2, f. 6: *Ophisma allardi* Ob. *O. leucochiton* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ophisma saalmulleri**, 1880 : 328. Holotype ♀: [Madagascar]. *O. saalmulleri* P.-Mab.: Syn de parallel d'après Hampson. Rapproche, dout . . . ♀: *Dermaleipa parallelipeda* Gn.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ophisma varians**, 1898 : 224. Zambèse and Conakry. Not found.
- Ophiusa daedalea**, 1879a : 93. LECTOTYPE ♀ (not ♂ as recorded): *O. daedalea* P. Mab. [Madagascar], Sta. Maria: = *sypnoides* Butl. ♀ [det. Hampson]: *Serodes daedalea* P. Mab. synonymie *maeandrica* Slm. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

- Ophiusa digona*, 1879b : 141. Viette, 1954 : 385. Lectotype ♂: Madagascar, de Saint-Augustin à Tuléar (*A. Grandidier* 1867) (coll. Mabille). In M.N.P.
- Ophiusa nigrimacula*, 1880 : 347. Viette, 1954 : 385. Lectotype ♂: Madagascar, de Saint-Augustin à Tuléar (*A. Grandidier* 1867). In M.N.P.
- Ophiusa orthaea*, 1890 : 44. Holotype ♂: Assin. [Ivory Coast, Assinie]: *Ophiusa orthaea* Mab. afr. occ. [afrique occidentale]: *Ophiusa orthaea*: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Ophiusa subangularis*, 1890 : 46. Holotype ♂: [Comoro Is.], Mayotte: *Ophiusa subangularis* Mab. Mayotte [twice]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Orthosia ? arcifera*, 1881 : lvi. Viette, 1954 : 385. Lectotype ♀: Madagascar (coll. Mabille). In M.N.P.
- Orthosia mollis*, 1885 : 62. Holotype ♂: Terre de Feu, canal du Beagle (*Hyades & Hahn*). In M.N.P.
- Orthosia ochroglene*, 1881 : lvi. Holotype ♀: [Madagascar]. *Orth. ochroglene* M.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Orthosia purilinea*, 1885 : 62. Holotype ♀: Santa Cruz, Patagonie (*Lebrun*). In M.N.P.
- Penicillaria pyrospila*, 1893 : 60. Viette, 1954 : 385. Holotype ♂: Madagascar (coll. Joannis). In M.N.P.
- Penicillaria subrubens*, 1890 : 40. Holotype ♀: [Ivory Coast, Assinie]. *Penicil. subrubens* Mab. Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Phyllodes proetexatus*, 1882a : 134, Viette, 1954 : 385. Holotype ♂: Madagascar (coll. Thierry-Mieg < coll. Brabant). In M.N.P.
- Polydesma exarata*, 1890 : 42. Holotype ♂: [Without locality: ? W. Africa]. *Hom. exarata* Mab.: = *scandatula* [det. Hampson]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Raparna confusa*, 1900 : 734. Viette, 1954 : 385. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Raparna didyma*, 1900 : 734. Viette, 1954 : 386. Lectotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Rhanidophora enucleata*, 1900 : 732. Holotype ♀ (without body) : Afr. mer. [Afrique meridionale, not occidentali as recorded]: *Rhanidophora* sp. unnamed in B.M. [det. Hampson]: *Rhanidophora enucleata* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Sarothroceras alluaudi*, 1889a : xcix; 1890 : 37. Holotype ♂: [Ivory Coast, Assinie]. *Sarothroceras alluaudi* Mab. Ex musaeo P. Mabille 1923: *Sarothroceras alluaudi* Mab. Ann. Soc. ent. France 1890, p. 37 [det. Oberthür]: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Sarrothripa virgulana*, 1880c : xvii. Madagascar. Not found.
- Scotosia syngammata*, 1880c : xxiv. (Now *Entomogramma comb. n.*) Holotype ♂: [Madagascar]. *Scotosia syngammata* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Selenis dimidiaria*, 1893 : 61. Without locality. Not found.
- Selenis semiscripta*, 1893 : 61. Angola. Not found.
- Serrodes leucocelis*, 1880 : 330. Holotype ♀: Typicum specimen: [Madagascar] Ambaravan, Tamatave: *Catephia* (*Serrodes*) *leucocelis* Mab.: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

- Staga producta*, 1900 : 735. Viette, 1954 : 386. Holotype ♂ (sans abdomen): Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P. (Espèce type du genre).
- Stenopsis reducta*, 1880d : cviii. LECTOTYPE ♂: [Madagascar]. *Stenopsis reducta* Mab. [twice]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♂: *Stenopsis reducta* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Tarache acontina*, 1900 : 729. Holotype ♀: Afr. c. [= Afrique centrale]. In M.N.P.
- Tarache costosa*, 1900 : 728. Holotype ♀: without locality [Madagascar or Africa]. In M.N.P.
- Tarache decoripennis*, 1900 : 728. E. Africa. Not found.
- Tarache sublota*, 1900 : 728. Viette, 1954 : 386. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Thalpochares partita*, 1880c : xviii. Viette, 1954 : 386. Holotype ♂: Madagascar, I. Sainte-Marie de Madagascar (coll. Mabille). In M.N.P.
- Thalpochares trigrammos*, 1881 : lxi. Holotype ♀: [Angola]. Congo, Landana. In M.N.P.
- Thermesia anceps*, 1879b : 142. Holotype ♀: [Madagascar]. *Thermesia anceps* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Thermesia clarilinea*, 1900 : 732. Viette, 1954 : 386. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Thermesia junctilinea*, 1900 : 732. Viette, 1954 : 386. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Trigonodes hemidelta*, 1890 : 46. Holotype ♂: Mozamb. [Mozambique]: *Trigonodes hemidelta* Mab.: = *obstans* Wlk. [det. Hampson]: *Cuneisigna obstans* Wlk. = *hemidelta* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Xanthodes mariae*, 1881 : lx. Viette, 1954 : 386. Lectotype ♂: Madagascar, Nossy-Bé (coll. Mabille). In M.N.P.
- Xanthoptera coenogramma*, 1900 : 730. Viette, 1954 : 386. Holotype ♀: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.
- Zethes humilis*, 1900 : 733. Viette, 1954 : 386. Holotype ♂: Madagascar, baie d'Antongil (*A. Mocquerys*, 1898). In M.N.P.

#### AGARISTIDAE

- Aegocera elegantula*, 1893 : 56. Mabille & Vuillot, 1895 : 157, pl. 22 : 2. LECTOTYPE ♀: Verulam, Natal (*Spiller*): 299: *M. elegantula* Mab.: Cotype Mab.: 162. In Z.M.B.
- Aegocera obliqua*, 1893 : 56. Mabille & Vuillot, 1895 : 156, pl. 22 : 1. Holotype ♂: [W. Africa], Loko, 85, P. St. : 295: *Ae. obliqua* Mab.: 125. In Z.M.B.
- Agarista distigma*, 1898 : 219. Madagascar. Not found.
- Agarista epipales*, 1884a : clxxxix. LECTOTYPE ♂: *A. epipales* Mab. Madag. [Madagascar]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia deficiens*, Mabille & Vuillot, 1892 : 53, pl. 8 : 4. Mabille, 1892a : clxxxiii. Holotype ♀ (without abdomen): Afr. oc. [Afrique occidentale], *Xanthospilopteryx fatima* Kirb.: *X. deficiens* Mab. afr. oc. [Afrique occidentale]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia eoa*, 1890b : cxxiii. Holotype ♀: afric. or. [Afrique orientale]: *Eusemia eoa* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia interniplaga*, 1892a : clxxxiv. Holotype ♀: [W. Africa] *interniplaga* Mab. B.S. . . . 1891: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

- Eusemia (*Xanthospilopteryx*) melanochiton**, 1892a : clxxxiv. Mabille & Vuillot, 1893 : 123, pl. 17 : 2. Holotype ♀: Kamerun int., Barombi-Station, 1889 (*Preuss*). In Z.M.B.
- Eusemia metallica**, 1879a : 88. Holotype ♂: [Congo] *Eusemia metallica* P. Mab.: *Eusemia metallica* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia mozambica**, 1890b : cxxiii. Holotype ♀: zangbar [Zanquebar, historically E. African sea-board]: *mozambica* Mab. ♀: *Eusemia mozambica* Mab., Mozambique: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia nigridorsa**, 1890b : cxxiii. Holotype ♀: afr. oc. [afrique occidentale]: *Eusemia nigridorsa* ♀: *Eusemia nigridorsa* Mab., Guinea: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia novemmaculata**, 1890a : 54. Holotype ♀: E. g. maculata Mab. A.S. fr. 1890: *Eusemia g-maculata* Mab.: Zangabr. [Zanquebar, historically E. African seaboard]: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia obryzos**, 1879a : 89. Holotype ♀: Madag. [Madagascar]: *Eusemia obryzos* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia triangularis**, 1893 : 57. Mabille & Vuillot, 1895 : 158, pl. 22 : 3. LECTOTYPE ♂: Kamerun int., Barombi-Station, 1889 (*Preuss*): 332: *E. triangularis* Mab.: 169: Type. Paralectotype ♂: Kamerun int., Barombi Station, 1890 (*Preuss*). *Triangularis* Mab.: *Omphaliceps triangularis* Mab.: Type. Paralectotype ♂: Kamer. int. Pr.: Type. All in Z.M.B.
- Eusemia vectigera** see Hypsidae.
- Eusemia virguncula**, 1879b : 136. Holotype ♂: Madagasc. [Madagascar]: *Eusemia virguncula* P. Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Eusemia xanthopyga**, 1890b : cxxiv. LECTOTYPE ♂: *xanthopyga* Mab. ♂: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Paralectotype ♀: Afric. or. [Afrique orientale] *Eusemia xanthopyga* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. Both in B.M. (N.H.).
- Hypsa ambusta**, 1881 : lv. Holotype ♀ (without head and abdomen): *Hypsa ambusta* Mab. Madag. [Madagascar]: *Aganais ambusta* Mab.: rare P.M.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).
- Phalaenoides alluaudi**, 1898 : 219. Holotype ♀ (without abdomen): Madagasc. [Madagascar]: *Phalaenoides alluaudi* Mab.: Ex musaeo P. Mabille 1923: Ex Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3. In B.M. (N.H.).

### COCYTIIDAE

- Cocytia durvillii** Boisduval ab. *moestifica* Mabille & Vuillot, 1891 : 46, pl. 6 : 2. New Guinea. Not found.

### REFERENCE

- BERNARDI, G. & VIETTE, P. 1961. Que representent *Zygaena pennina* Rambur (1866), *Z. eudaemon* Mabille et *Z. mauretanicus* Mabille (1885) ?. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon* **30** : 140-145.
- BIRKET-SMITH, J. 1965. A revision of the West African Eilemic moths, based on the male genitalia. (Lep. Arctiidae, Lithosiinae). *Pap. Fac. Sci., Haile Sellassie I. Univ., C. (Zoology)* **1**. 161 pp., 122 text-figs.
- COLLENETTE, C. L. 1955. A catalogue of the Lymantriidae of Madagascar (Lepidoptera) *Naturaliste Malgache* **7** : 167-179.
- FLETCHER, D. S. 1967. A revision of the Ethiopian species and a Check List of the world species of *Cleora* (Lepidoptera : Geometridae). *Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl.* **8**. 119 pp., 14 pls., 146 text-figs., 9 maps.

- GRIVEAUD, P. 1964. *Faune de Madagascar XVII. Insectes Lépidoptères Amatidae*. 147 pp., 309 text-figs., 1 pl., 2 maps. Tananarive.
- HAMPSON, G. F. 1910. *Catalogue of the Noctuidae in the collection of the British Museum*. 10. xix+829 pp., 214 text-figs., pls. 148-173. London.
- MABILLE, P. 1867. Notices sur les Lépidoptères de la Corse. *Annls Soc. ent. Fr.* (4) 6 : 545-564, pl. 8.
- 1868. Notices sur les Lépidoptères de la Corse avec une énumération monographique des Eupithécies de la Corse. *Annls Soc. ent. Fr.* (4) 7 : 635-658, pl. 14.
- 1869. Notices sur les Lépidoptères de la Corse (espèces nouvelles), avec la liste des *Acidalides* de ce pays, la 2<sup>e</sup> partie de l'énumération monographique des Eupithécies de la Corse et la description de quatre *Eupithecia* nouvelles pour la faune parisienne (3<sup>e</sup> notice). *Annls Soc. ent. Fr.* (4) 9 : 53-80, pl. 2.
- 1870. Petites Nouvelles: *Eupithecia chloerata*. *Petites Nouv. Ent.* 2 (24) : 96.
- 1871. Petites Nouvelles: "Les Eupithecia du groupe d'*oxydata* . . . .". *Petites Nouv. Ent.* 3 (42) : 168.
- 1873. Recherches et observations lépidoptérologiques, 1<sup>er</sup> partie. *Annls Soc. ent. Fr.* (5) 2 : 489-502, pl. 15.
- 1876. *Selidosema oliveirata* (sp. nov.). *Bull. Soc. ent. Fr.* 1876 : cix.
- 1877. Diagnose d'un nouveau Sphingide provenant du Congo. *Bull. Soc. zool. Fr.* 2 : 491.
- 1878. Saturnide nouvelle (*Antheraea laestrygon*). *Bull. Soc. ent. Fr.* 1877 : clxxx.
- 1879. Note sur une petite collection de Lépidoptères recueillis à Madagascar. *Naturaliste* 1 (3) : 20-21.
- [1879a.] Lepidoptera Africana. *Bull. Soc. zool. Fr.* 3 : 81-95.
- 1879b. Lepidoptera Madagascariensia; species novae. *Bull. Soc. philomath. Paris* (7) 3 : 132-144.
- 1879c. Recensement des Lépidoptères hétérocères observés jusqu'à ce jour à Madagascar. *Annls Soc. ent. Fr.* (5) 9 : 291-304.
- 1879d. Diagnoses d'espèces nouvelles. *Guide du Naturaliste. Revue bibliq. Sci.* 1 : 26.
- 1880. Recensement des Lépidoptères hétérocères observés jusqu'à ce jour à Madagascar. *Annls Soc. ent. Fr.* (5) 9 : 305-348.
- 1880a. Une note sur le genre *Eucrostis*. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1879 : cliv-clv.
- 1880b. Descriptions de trois nouvelles espèces de Lépidoptères de Madagascar. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1879 : clxxiii-clxxiv.
- 1880c. Diagnoses Lepidopterorum malgassicorum. *C. r. Séanc. Soc. ent. Belg.* 1880 : xvi-xxvii.
- 1880d. Note sur une collection de Lépidoptères recueillis à Madagascar. *C. r. Séanc. Soc. ent. Belg.* 1880 : civ-cix.
- 1881. Note sur plusieurs envois de Lépidoptères provenant de Madagascar. *C. r. Séanc. Soc. ent. Belg.* 1881 : lv-lxiii.
- 1882. Description de Lépidoptères de Madagascar. *Naturaliste* 2 (13) : 99-100.
- 1882a. Description de Lépidoptères de Madagascar. *Naturaliste* 2 (17) : 134-135.
- 1884. In De Rochebrune, A-T. Diagnoses d'Arthropodes nouveaux propres à la Sénégambie. *Bull. Soc. philomath. Paris* (7) 8 : 30-31.
- 1884a. Descriptions de Lépidoptères exotiques. *C. r. Séanc. ent. Soc. Belg.* 1884 : clxxxiv-cxci.
- 1885. Diagnoses de Lépidoptères nouveaux. *Bull. Soc. philomath. Paris* (7) 9 : 55-70.
- 1888. *Mission scientifique du Cap Horn 1882-1883* 6 (2), *Lépidoptères*. 35 pp., 3 pls. Paris.
- 1888a. Descriptions d'espèces nouvelles de Lépidoptères de Tunisie et d'Algérie. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1888 : xlii-xliii; li-lii; lviii-lix; lxviii.
- 1889. Recherches sur les insectes recueillis pendant la mission chargée d'observer à Santa-Cruz de Patagonie le passage de Vénus. Lépidoptères. *Nouv. Annls Mus. Hist. nat. Paris* (3) 1 (2) : 139-159, pls. 10, 11.
- 1889a. Un Lépidoptère Hétérocère d'Afrique remarquable par sa taille et ses couleurs. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1889 : xcix-c.

- 1890. Voyage de M. Ch. Alluaud dans le territoire d'Assinie (Afrique occidentale) en juillet et août 1886, 4<sup>e</sup> mémoire; Lépidoptères, avec des notes sur quelques autres espèces d'Afrique (Rhopalocera et Heterocera). *Annls Soc. ent. Fr.* (6) **10** : 17-51, pls. 2, 3.
- 1890a. Descriptions de quatre Lépidoptères nouveaux. *Annls Soc. ent. Fr.* (6) **10** : 52-54.
- 1890b. Note sur les *PHALAENA EUPHEMIA* Cram. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1890** : cxxiii-cxxiv.
- 1891. Notes lépidoptérologiques. *Bull. Soc. ent. Fr.*, **1890** : cxlvi-cxlix.
- 1891a. Une espèce nouvelle de *Cyligramma*. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1891** : xc.
- 1891b. Une espèce nouvelle de *Noleya*. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1891** : cxxvii.
- 1892. Les descriptions de deux Lépidoptères nouveaux. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1891** : clxxiv-clxxv.
- 1892a. Note synonymique et descriptions de Lépidoptères nouveaux. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1891** : clxxxii-clxxxv.
- 1892b. Six Lépidoptères Hétérocères d'Afrique. *Bull. Soc. ent. Fr.*, **1892** : cxxxviii-cxli.
- 1892c. Sur *Zygaena sardoa*. *Bull. Soc. ent. Fr.*, **1892** : cl.
- 1893. Description de Lépidoptères nouveaux. *Annls Soc. ent. Belg.* **37** : 50-65.
- 1898. Description de Lépidoptères nouveaux. *Annls Soc. ent. Fr.*, **66** : 182-231, pl. 9.
- 1899. Description d'une Lithoside nouvelle de l'île Maurice [Lép.] *Bull. Soc. ent. Fr.* **1899** : 220.
- 1899a. Descriptions de Lépidoptères nouveaux de Madagascar. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1899** : 270.
- 1900. Lepidoptera nova malgassica et africana. *Annls Soc. ent. Fr.* **68** : 723-753.
- 1906. Notes sur plusieurs Lépidoptères de la faune palaeartique. *Annls Soc. ent. Fr.*, **75** : 31-36, pl. 3.
- 1906a. Essai sur la faune de l'île d'Oléron. *Annls Soc. ent. Fr.* **75** : 37-56, pl. 3.
- 1907. Description d'une Noctuelle nouvelle de la faune française. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1907** : 37.
- 1907a. Note descriptive sur deux Lépidoptères de l'Afrique septentrionale. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1907** : 79.
- 1907b. Description d'un Lépidoptère nouveau de Tunisie. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1907** : 308.
- 1908. Descriptions de Lépidoptères tunisiens nouveaux. *Bull. Soc. ent. Fr.* **1908** : 67-69.
- 1916. Aberration femelle de l'*Hibernia marginaria*, Borkh. [Lepid.] *Bull. Soc. ent. Fr.* **1916** : 141.
- MABILLE, P. & VUILLOT. 1890. Novitates Lepidopterologicae. **1**. 8 pp., 1 pl., Paris.
- 1891. *op. cit.* **6**. 8 pp. (41-48), 2 pls. (6, 7).
- 1892. *op. cit.* **7**. 5 pp. (49-53), 2 pls. (8, 9).
- 1893. *op. cit.* **11**. 28 pp. (107-134), 4 pls. (15-18).
- 1895. *op. cit.* **12**. 27 pp. (135-161), 4 pls. (19-22).
- OBERTHÜR, C. 1893. *Études d'Entomologie*. **18**. 49 pp., 6 pls. Rennes.
- 1925. *Études de Lépidoptérologie comparée*. **22** (2). xxi+103 pp., pls. 1-41+dxci-dc. Rennes.
- RAGONOT, E. L. 1893. In ROMANOFF, *Mémoires sur les Lépidoptères*. **7**. lvi+658 pp., 23 pls.
- VIETTE, P. 1951. Contribution à l'étude des Cossidae. *Naturaliste malgache*, **3** (2) : 133-138, pl. 3, 1 text-fig.
- 1954. Les types des Lépidoptères Hétérocères malgaches de Mabille se trouvent au Museum national, Paris. *Mém. Inst. Sci. Madag.* (E) **5** : 377-387.
- 1954a. Descriptions de quatre nouvelles espèces malgaches de Noctuidae Quadrifides (Lepid.). *Lambillionea*, **54** : 9-13.
- WATSON, A. 1965. A Revision of the Ethiopian Drepanidae (Lepidoptera). *Bull. Br. Mus. nat. Hist.* (Ent.) Suppl. **3**, 178 pp., 18 pls., 270 text-figs., 7 maps.
- WHALLEY, P. E. S. 1964. Catalogue of the world genera of the Thyrididae (Lepidoptera) with type selection and synonymy. *Ann. Mag. nat. Hist.* (13) **7** : 115-127.
- 1967. *Faune de Madagascar XXIV. Insectes Lépidoptères Thyrididae*. 52 pp., 14 pls.

## INDEX OF SPECIFIC AND FAMILY NAMES

- achilleata, 400  
 achroellum, 395  
 acontina, 416  
 acosmialis, 395  
 acrochiona, 412  
 acrosema, 411  
 AGERIIDAE, 393  
 aequaria, 401  
 aequatoria, 414  
 aesalon, 404  
 aethes, 409  
 affinis, 394  
 AGARISTIDAE, 416  
 agrammaria, 397  
 agrotidea, 411  
 albicornaria, 399  
 albidiorata, 402  
 albipunctaria, 402  
 albistriga, 413  
 albogrisearia, 401  
 albosectana, 392  
 albotessulalis, 395  
 allardiata, 397  
 alluaudi,  
     Phalaenoides, 417  
 alluaudi,  
     Sarthroceras, 415  
 amaurobapha, 406  
 amblyops, 411  
 ambusta, 408, 417  
 anapera, 407  
 anceps, 416  
 angulalis, 413  
 angulina, 409  
 angustipennis, 404  
 antelmaria, 398  
 antennata, 402  
 antongilensis, 396  
 aphe, 409  
 apicimacula, 412  
 apicitudana, 392  
 arcifera, 415  
 arciferana, 392  
 ARCTIIDAE, 406  
 arenularia, 402  
 argenna, 405  
 argibasis, 403  
 argyrochrysalis, 395  
 argyrographa, 413  
 argyromixtana, 392  
 argyropeza, 404  
 asopialis, 396  
 aspersa, 407  
 atrana, 392  
 atrilunaria, 398  
 atromarginata, 397  
 atropunctalis, 396  
 atroviridaria, 402  
 aurantia, 401, 406  
 auricolor, 403  
 baltealis, 397  
 barbipes, 394  
 barica, 405  
 barrei, 404  
 basilaria, 398  
 bicolor, Agrotis, 409  
 bicolor, Arctia, 406, 410  
 bicolor, Calophasia, 411  
 bifasciata, 404  
 bifenestralis, 395  
 biformis, 409  
 bijuga, 406  
 bilineata, 403  
 binaevata, 402  
 binotata, 405  
 biradiellus, 395  
 bombus, 404  
 breviculus, 392  
 brunneomixta, 404  
 bucephalina, 410  
 butleri, 407  
 buxicolaria, 398  
 callichromalis, 395  
 calligrammalis, 395  
 cambouei, 394  
 campanalis, 412  
 carbonifera, 409  
 castanea, 394  
 cataleucaria, 401  
 catenata, 406  
 cazeti, 411  
 chionea, 408  
 chloerata, 400  
 chlorinaria, 401  
 chloromelana, 409  
 chrysotalis, 395  
 cincta, 403  
 cirrochroa, 406  
 citrinarius, 398  
 clarilinea, 416  
 cocciniceps, 406  
 COCYIIDAE, 417  
 coenogramma, 416  
 colini, Areas, 405  
 colini, Dasychira 394, 405



- concinnulla*, 408, 413  
*concors*, 411  
*confusa*, 415  
*consentanea*, 410  
*contortalis*, 413  
*convexaria*, 399  
*corsica*, 413  
 COSSIDAE, 392  
*costalbella*, 396,  
*costimacula*, 406  
*costosa*, 416  
*crasselimbaria*, 401  
*crocea*, 411  
*croceina*, 397  
*crocifrontalis*, 397  
*crystallophana*, 402  
*culiculina*, 394, 407  
*curtiplaga*, 408  
*cuspidata*, 397  
*cyanealis*, 396  
*cyanoxantha*, 394  
*cyclina*, 414  
*cyrnaea*, 414
- daedalea*, 414  
*datini*, 403  
*decoripennis*, 416  
*deficiens*, 416  
*dentata*, 400  
*depauperata*, 406  
*deserticola*, 393  
*desmialis*, 396  
*dianthaeciae*, 410  
*diaphanella*, 405  
*didyma*, 415  
*digona*, 415  
*digamma*, 410  
*dimidiaria*, 415  
*diospyri*, 403  
*directa*, 403  
*directaria*, 402  
*disticlaria*, 400  
*distictana*, 392  
*distigma*, 416  
*diva*, 406  
*dnopheralis*, 396  
 DREPANIDAE, 397  
*dumonti*, 399
- ectypata*, 399  
*elegantula*, 416  
*enucleata*, 415  
*coa*, 416  
*epipales*, 416  
*erebenna*, 412
- erythralis*, 395  
*erythraria*, 398  
*erythrogaster*, 393, 407  
*erythropleura*, 406  
*eudaemon*, 394  
*eugrapharia*, 400  
*exarata*, 415
- fadella*, 400, 405, 406  
*faeculentaria*, 397  
*faedellus*, 395  
*fasciata*, 402  
*ferruginaria*, 401  
*fidjiensis*, 405  
*fissurata*, 401  
*flammea*, 406  
*flavens*, 404  
*flavicapilla*, 393  
*flexuaris*, 412  
*florens*, 413  
*frigida*, 410  
*fulveolans*, 393  
*fuscus*, 392  
*fusicolor*, 403
- galactina*, 405, 406  
*galeatella*, 393  
*gambeyi*, 403  
 GELECHIDAE, 393  
*geminata*, 409  
 GEOMETRIDAE, 397  
*gilvicolor*, 412  
*gitana*, 411  
*glyphicarius*, 398  
*glyptalis*, 413  
*goossensiata*, 400  
*grandalis*, 395  
*grandidieri*, 404  
*grandis*, 406  
*gravalis*, 413  
*gravida*, 410  
*griseoalbata*, 402  
*griseolineata*, 396  
*gueneana*, 403
- hemichionalis*, 397  
*hemidelta*, 416  
*hemigrammalis*, 413  
*hemigrammata*, 399  
*hemileucaria*, 400  
*hemistrigata*, 402  
 HEPIALIDAE, 392  
*heptasticta*, 405  
*heterochroa*, 406  
*heterogramma*, 410

- hispanica, 411  
 holobapharia, 397  
 holoxanthalis, 395  
 holoxanthina, 394  
 homochromata, 401  
 honestata, 397  
 hucherardi, 413  
 humilis, Parasa, 394  
 humilis, Zethes, 416  
 hyadesi, 403  
 hyadesii, 399  
 HYPSIDAE, 408  
  
 i-graecum, 410  
 imitans, 406  
 imparivirgalis, 396  
 inaequivirgaria, 402  
 incomparabilis, 408  
 indiscretaria, 400  
 ingoufii, 410  
 inquinata, 412  
 insignis, 395  
 insularia, 399  
 interniplaga, Eusemia, 416  
 interniplaga, Syntomis, 408  
 iridea, 393, 407  
 iridisquama, 393  
  
 joannisii, 393  
 junctilinea, 416  
  
 kermesina, 414  
  
 lacteola, 414  
 laestrygon, 403  
 landanata, 398  
 LASIOCAMPIDAE, 403  
 lebruni, 410  
 lentiscata, 400  
 lepidocerella, 396  
 leptinia, 414  
 lesaunieri, 400  
 leucocelis, 415  
 leucochiton, 414  
 leucochloraria, 401  
 leucoglène, 412  
 leucolepis, 405  
 leucophanalis, 396  
 leucopleuralis, 396  
 leucospilana, 392  
 leucothyralis, 396  
 leucotriangula, 396  
 lignitea, 404  
 lilliputaria, 400  
 LIMACODIDAE, 394  
  
 limbolata, 397  
 locuples, 392, 394  
 longicornalis, 397  
 lucasi, 397  
 luteipes, 400, 405  
 luteivittalis, 396  
 luteofusalis, 397  
 luteorubens, 402  
 LYMANTRIIDAE, 405  
 lyperalis, 413  
  
 macularia, 411  
 maculifera, 409  
 magellana, 411  
 malacellus, 395  
 malefidaria, 399  
 malesignaria, 402  
 malgassalis, 396  
 malgassaria, 403  
 malgassica, Acontia, 409  
 malgassica, Hypopyra, 413  
 mariae, 416  
 marmor, 404, 406  
 mauritanica, 394  
 mauritia, 406  
 mauritiaria, 400  
 mecynoides, 408  
 megalena, 414  
 megalesia, 413  
 melanimon, 407  
 melanis, 411  
 melanocera, 405  
 melanochiton, 417  
 melanthiata, 401  
 melinos, 408  
 meridionalis, 400  
 merulina, 411  
 mesargyrata, 401  
 metallica, 417  
 microcycla, 409  
 microptera, 409  
 miegii, Aconthia, 409  
 miegii, Hyperythra, 400  
 minians, 414  
 minoralis, 396  
 minutalis, 395  
 m-nigrum, 407  
 moestifica, 417  
 mollis, 415  
 monacmaria, 399  
 monilifera, 403  
 monogrammaria, 398  
 monotretalis, 395, 411  
 mozambica, 417  
 multivirgulata, 401

- muscella, 408  
 mutabilis, 399
- nagaloo, 412  
 nanula, 399  
 nasuta, 410  
 nepetata, 400  
 nephelea, 414  
 nigridora, 417  
 nigrimacula, 415  
 nigronaevalis, 395  
 nigroradians, 395  
 NOCTUIDAE, 409  
 nolana, 405  
 NOLIDAE, 409  
 NOTODONTIDAE, 404  
 novemmaculata, 417  
 nudilimbaria, 400
- obliqua, 416  
 obryzos, 417  
 obscurata, 411  
 obscurus, 404  
 obsitaria, 398  
 obvallaria, 399  
 ocellata, 393  
 ochragyra, 412  
 ochroderoea, 405  
 ochroglene, 415  
 ochrorubens, 407  
 octo, 394  
 oculata, 401  
 oedipodina, 409  
 oegrapha, 404  
 oligomelas, 410  
 oliveirata, 402  
 opalinula, 394  
 ophiusinalis, 413  
 orea, 409  
 orthaea, 415  
 orthogramma, 414
- pallidicosta, 406  
 pallidularia, 401  
 pallidulata, 402  
 parallelalis, 413  
 partita, 416  
 parvipuncta, 394, 408  
 pelias, 403  
 pelidne, 393, 407  
 pelor, 414  
 peridromella, 396  
 periplocalis, 412  
 perornata, 399  
 perpusilla, 407
- phaeosericea, 405  
 picturata, 409  
 pierronii, 414  
 plagiogramma, 403  
 platyptera, 405  
 plumosa, 407  
 pluripunctata, 406  
 polyacmaria, 399  
 polychroaria, 399  
 ponderosa, 414  
 producta, 416  
 proetexatus, 415  
 PSYCHIDAE, 393  
 pterophorina, 408  
 PTEROTHYSANIDAE, 403  
 pudens, 410  
 pulchellalis, 397  
 punctifera, 403  
 punctistriata, 398  
 punctistrigana, 392  
 punctistrigellus, 395  
 punctuligera,  
     Anchirithra, 405  
 punctuligera,  
     Metrocampa, 401  
 purilinea, 415  
 pusilla, 396  
 pusillana, 392  
 PYRALIDAE, 395  
 pyrenaeata, 400  
 pyrospila, 415
- quadrimacula, Erastria, 412  
 quadrimacula, Naclia, 407  
 quadresectaria, 402  
 quadrivirgula, 411  
 quinquemacula, 408  
 quinquepunctatum, 407
- radama, 406  
 ragonoti, 408  
 ramburii, 406  
 rasana, 409  
 reducta, Stenopis, 416  
 reducta, Syntomis, 408  
 remigina, 412  
 rhodophora, 405, 413  
 rhodotaenia, 412  
 rhodotenia, 399  
 robleti, 407  
 rosea, 412  
 rubedinaria, 400  
 rubefacta, 414  
 ruberata, 402  
 rubicunda, 408

- rubriceps*, 408  
*rubrifucalis*, 397  
*rubroneurella*, 396  
*rubronotata*, 393  
*rubrosignaria*, 398  
*rubrostrigana*, 393  
*rufcolalis*, 396  
*rufocellata*, 400  
*rufofusca*, 405  
*rufolutaria*, 398  
*rufomixta*, 410  
*rufostellata*, 400  
*rugifrons*, 410  
*russulata*, 399  
  
*saalmulleri*, *Athyria*, 410  
*saalmulleri*, *Ophisma* 414  
*sabura*, 410  
*saclava*, 393  
*saclavus*, 393  
*sanguinolenta*, 406  
*santolinata*, 400  
*sardoa*, 394  
*saturatella*, 396  
 SATURNIDAE, 403  
*saturnina*, 410  
*scodionata*, 402  
*selenana*, 393  
*semifasciata*, 403  
*semilimbalis*, 396  
*semilotaria*, 401  
*semiscripta*, 415  
*semistrigella*, 396  
*semitinctaria*, 400  
*septemnotata*, 395  
*septempunctalis*, 396  
*sericina*, 414  
*serralis*, 412  
*serrata*, 406  
*setodiformis*, 393  
*sigillata*, 399  
*signifrontaria*, 401  
*silenicolata*, 400  
*simplex*, 411  
*simulans*, 407  
*sinistra*, 409  
*smithii*, 411  
*sordida*, 403  
*sparispunctata*, 398  
*spissicornis*, 404  
*spissilimbaria*, 398  
 SPHINGIDAE, 404  
*staudingeralis*, 395  
*stenopalis*, 395  
*stenopterata*, 401  
  
*stigmatica*, 404  
*stipulaceana*, 393  
*strigatus*, 394  
*suaedicola*, 393  
*suarezia*, 405  
*subangularis*, 415  
*subcurvaria*, 402  
*sublota*, 416  
*subnigrans*, 404  
*subocularia*, 398  
*subolivalis*, 410  
*subreticulata*, 402  
*subrosea*, 407  
*subrubens*, 415  
*subsignata*, 413  
*subtilis*, 412  
*subulva*, 403  
*syngammata*, 402, 415  
 SYNTOMIDAE, 407  
*syrtana*, 411  
  
*tarachoides*, 411  
*tenebrosa*, 410  
*tenera*, 407  
*terminalis*, 396  
*terrearia*, 398  
*terrena*, 413  
*terreola*, 394  
*tetragona* 412  
*tetrathyra*, 397  
*thalerella*, 396  
 THYRIDIDAE, 394  
*tigridalis*, 395  
 TINEIDAE, 393  
 TORTRICIDAE, 392  
*triangularis*, 417  
*tricoloraria*, 402  
*trigonalis*, 395  
*trigrammos*, 416  
*trilineata*, 411  
*trimacula*, 407  
*tripartitella*, 393  
*tripunctata*, 394  
*trisema*, 410  
*tresignata*, 411  
*trispila*, 410  
*tristigma*, 407  
*trivirgalis*, 397  
*trivittata*, 401  
*turpalis*, 414  
*typhlina*, 410  
  
*umbriferella*, 395  
*umbriger*a, *Achaea*, 409  
*umbriger*a, *Lithosia*, 407

unedonata, 400  
unicolorana, 392  
uniflexalis, 397  
univirgaria, 402  
URANIIDAE, 402

variabilis, 412  
varians, 414  
vectigera, 408, 417  
velutina, 406  
venerata, 401  
venilialis, 395  
virgellata, 402

virgulana, 415  
virguncula, 417  
viridellaria, 401  
vitrina, 405  
vulgaris, 412

xanthopyga, 417  
xanthostola, 410

zerenaria, 400  
zonalis, 395  
ZYGAENIDAE, 393  
zygaenoides, 408

